

بررسی تناوب داری میکروفیلر دیرووفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران*

دکتر علی اسلامی^۱ دکتر بینام مشکنی^۲

ریخته شد و به رسوب یک قطره بلودومتیلن اضافه گردید و تعداد کل میکروفیلرهای موجود در رسوب (۱ سانتیمتر مکعب خون) هر نمونه خون شمارش گردید و براساس مقایسه میانگین سه شمارش در هر سلعت، تناوب ظهور میکروفیلر دیرووفیلاریا ایمی تیس در خون مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

از آنجاکه تنها میکروفیلر قابل اشتباہ با میکروفیلر دیرووفیلاریا ایمی تیس در خون سگهای ایران میکروفیلر دیپتالونما رکوندیتوم (*Dipetalonema reconditum*) است با استفاده از کلیدهای ارایه شده توسط باکسون و اتو (۱۹۷۴)، ردینگتون و همکاران (۱۹۷۷) و جرجی (۱۹۹۰) و با درنظر گرفتن سایر ویژگیها نظیر تعداد بیشتر میکروفیلر در هر سانتیمتر مکعب خون نسبت به دیپتالونما رکوندیتوم، عدم وجود زانه رأسی و باریک شدن تدریجی انتهای قدامی و عدم مستقیم که همگی در میکروفیلر دیرووفیلاریا ایمی تیس دیده می‌شوند، دو میکروفیلر از یکدیگر تشخیص داده شد.

نتیجه شمارش میکروفیلر در ۷۲ نمونه خون در جدول ۱ خلاصه شده است. اطلاعات موجود در جدول ۱ و نمودار ۱ نشان می‌دهد که میانگین تعداد میکروفیلرهای شمارش شده در هر ساعت از شبانه‌روز، در ساعت ۱۰ صبح به حداقل (۴۵۷ عدد) و در ساعت ۲۳ شب (۱۴۹۰۰ عدد) به حداکثر می‌رسد. اگرچه بطورکلی از ساعت ۱۷ بعدازظهر تا ساعت ۲۴ نیمه شب تعداد میکروفیلر افزایش می‌یافتد و از ساعت یک بعد از نیمه شب تا ساعت ۱۶ بعدازظهر سیر نزولی طی می‌نمود که نشان دهنده تناوب شبانه است. بررسی میانگین سه شمارش میکروفیلر در هر ساعت از شبانه‌روز نیز مؤید نوعی تناوب شبانه است زیرا با توجه به اینکه این بررسی در بهمن ماه صورت گرفت میانگین تعداد میکروفیلر در دوره تاریکی (۱۸ تا ۲۷ صبح) (۱۱۹۰۶) و در دوره روشنایی (۷ صبح تا ۱۸ بعدازظهر) (۶۹۳) بود که نوعی تناوب ظهور در دوره تاریکی و روشنایی را نشان می‌دهد.

بحث

در کلیه بررسیهای انجام گرفته در نیمکره شمالی و جنوبی دنیا درباره تناوب داری میکروفیلر دیرووفیلاریا ایمی تیس نشان داده است که میکروفیلر در تمام مدت شبانه‌روز در خون وجود دارد (شنل و یونگ، ۱۹۴۴؛ اوزبی ولین، ۱۹۵۱؛ سولزبی، ۱۹۸۶؛ ماتولا، ۱۹۹۱؛ ری و همکاران، ۱۹۹۸) که با یافته‌های بررسی حاضر همخوانی دارد ولی وجود حداقل وحداکثر تعداد میکروفیلر در خون در نواحی مختلف جهان برحسب ساعتهای یک شبانه‌روز اکثراً نشان دهنده نوعی تناوب ظهور شبانه است که در این مورد نیز نتایج بررسی حاضر را مورد تأیید قرار می‌دهد. در یک بررسی در گره (ری و همکاران، ۱۹۹۸) با خوتوگیری هر ۲ ساعت یکبار از ۱۰ قلاده سگ مبتلا به دیرووفیلاریا ایمی تیس به مدت ۷۲ ساعت نشان داده شد که حداکثر میکروفیلر در خون در ساعت ۲۱ (در مقایسه با نیایع ۲۳ در بررسی حاضر) و حداقل آن در ساعت ۱۱ صبح (در مقایسه با ساعت ۱۰ صبح در بررسی حاضر) دیده می‌شود. در بررسیهای انجام گرفته در امریکای شمالی (شنل و یونگ، ۱۹۴۴) و فرانسه (اویزی ولین، ۱۹۵۱) زمان ظهور

مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۵۵، شماره ۲، ۱۸ - ۱۵، (۱۳۷۹)

بررسی وجود یا عدم وجود تناوب ظهور میکروفیلر در خون یک قلاده سگ در اطراف تهران که به طور طبیعی مبتلا به دیرووفیلاریا ایمی تیس بود (بعد از تشخیص تفریقی میکروفیلر آن از سایر میکروفیلرهای موجود در خون سگ) نشان داد که نوعی تناوب شبانه وجود دارد. از یک قلاده سگ به مدت سه شبانه‌روز هر ساعت یکبار و در مجموع ۲۲ مرتبه از ورید دست و یا پا خونگیری به عمل آمد. نمونه‌های خون با استفاده از روش تکمیل شده نات آزمایش شد و در هر نوبت تعداد میکروفیلرها در یک سانتیمتر مکعب خون شمارش گردید. اگرچه میکروفیلر دیرووفیلاریا ایمی تیس در تمام مدت شبانه‌روز در خون دیده شد، ولی در ساعتهای مختلف تعداد آنها متفاوت بود. به طورکلی از ساعت ۱۷ بعدازظهر تا ۲۴ نیمه شب افزایش می‌یافتد و از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ بعدازظهر سیر نزولی داشت به طوری که براساس میانگین سه شمارش میکروفیلر در سه شبانه‌روز حداکثر تعداد میکروفیلر (۱۴۹۰۰) در ساعت ۲۳ شب و حداقل (۴۵۷) در ساعت ۱۰ صبح مشاهده گردید.

واژه‌های کلیدی: تناوب داری، سگ، دیرووفیلاریا ایمی تیس.

انگلها برای ادامه سیر تکاملی و بقای تسل خود از راهبردهای مختلفی استفاده می‌کنند. تعداد زیادی از فیلرهای میلیونها انسان و حیوان در دنیا و ایران به آنها مبتلا هستند دارای تناوب ظهور نوزاد (میکروفیلر) در خون هستند. زمان ظهور عمده‌تاً با زمان فعالیت پشه میزان واسطه مطابقت دارد. از جمله می‌توان به فیلرهایی نظیر وشرربیا بانکرفتی (*Wuchereica broncrofti*)، (عامل کوری رودخانه) و دیرووفیلاریا ایمی تیس (Dirofilaria immitis) (عامل بیماری کرم قلب) اشاره کرد.

وجود یا عدم وجود تناوب ظهور میکروفیلرهای مختلف در خون در تمام نواحی دنیا از نظم یکسانی پیروی نمی‌کند، مثلاً دیرووفیلاریا ایمی تیس در برخی نواحی دنیا از جمله آمریکای شمالی، فرانسه و فیلیپین دارای تناوب ظهور میکروفیلر در خون و در برخی نقاط دیگر مانند استرالیا فاقد چنین تناوبی است. در بررسی حاضر که برای اولین بار در ایران انجام می‌شود در یک قلاده سگ که به طور طبیعی مبتلا به دیرووفیلاریا ایمی تیس بود. تناوب ظهور میکروفیلر در خون بررسی گردید.

مواد و روش کار

جهت بررسی وجود تناوب ظهور میکروفیلر دیرووفیلاریا ایمی تیس در خون از ورید دست و پای ۱۳۸ قلاده سگ گله اطراف تهران خونگیری بعمل آمد. پس از یافتن یک قلاده سگ ۵ ساله نر، که به طور طبیعی آلوده به دیرووفیلاریا ایمی تیس بود حیوان به دانشکده دامپزشکی منتقل گردید. تشخیص دقیق ابتلا به دیرووفیلاریا ایمی تیس براساس تشخیص تفریقی میکروفیلر این فیلر از سایر فیلرهای گزارش شده در سگهای ایران (اسلامی، ۱۳۷۶) انجام شد. از این سگ به مدت سه شبانه‌روز هر ساعت یکبار (۲۲ بار) از ورید دست و پا خونگیری به عمل آمد. نمونه‌ها با استفاده از روش تکمیل شده نات (Modified knott Method) آزمایش گردید و مخلوط یک سانتیمتر مکعب خون با ۹ سانتیمتر مکعب فرمالین ۲ درصد به آرامی تکان داده شد تا گلولهای قرمز همولیز شوند، سپس به مدت ۵ دقیقه در ۱۵۰۰ دور سانتریفیوز گردید، بعد از آن مایع رو دور

* گروه آموزشی انگلشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

** امتار لازم برای انجام این پژوهش توسعه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران فراهم شده است.



جدول ۱ - تعداد میکروفیلر دیروفیلاریا ایمی تیس در هر سانتیمتر مکعب خون در سه دوره ۲۴ ساعته

ساعت	تعداد میکروفیلر	روز اول	روز دوم	روز سوم	میانگین
۱	۴۱۲۵	۱۰۱۶۷	۱۰۷۵۰	۸۲۴۷	۸۲۴۷
۲	۶۸۷۵	۵۸۲۳	۱۲۰۰۰	۸۲۳۶	۸۲۳۶
۳	۲۳۷۵	۱۰۰۰۰	۹۲۵۰	۷۲۰۸	۷۲۰۸
۴	۲۵۰۰	۱۲۰۰۰	۸۵۰۰	۷۶۶۷	۷۶۶۷
۵	۴۳۷۵	۷۵۰۰	۹۰۰۰	۶۹۵۸	۶۹۵۸
۶	۴۶۲۵	۹۰۰۰	۱۱۵۰۰	۸۳۷۵	۸۳۷۵
۷	۴۳۷۵	۱۲۷۵۰	۱۰۳۴۳	۹۱۵۳	۹۱۵۳
۸	۳۲۵۰	۸۰۰۰	۹۵۰۰	۶۹۱۷	۶۹۱۷
۹	۶۰۰۰	۶۲۰۰	۷۰۰۰	۶۴۰۰	۶۴۰۰
۱۰	۴۱۲۵	۳۲۲۳	۶۲۲۳	۴۵۹۷	۴۵۹۷
۱۱	۶۰۰۰	۶۵۰۰	۵۲۲۳	۵۹۴۴	۵۹۴۴
۱۲	۵۳۷۵	۶۸۳۳	۴۵۰۰	۵۵۶۹	۵۵۶۹
۱۳	۳۸۷۵	۵۵۰۰	۸۸۳۳	۶۰۶۹	۶۰۶۹
۱۴	۵۰۰۰	۵۸۰۰	۱۰۰۰۰	۶۹۳۳	۶۹۳۳
۱۵	۱۸۷۵	۶۳۲۳	۹۲۵۰	۵۸۱۹	۵۸۱۹
۱۶	۳۶۲۵	۴۱۶۶	۶۱۶۶	۴۶۵۲	۴۶۵۲
۱۷	۷۲۷۵	۱۲۰۰۰	۱۵۳۴۳	۱۱۵۶۹	۱۱۵۶۹
۱۸	۴۱۲۵	۱۰۵۰۰	۱۵۵۰۰	۱۰۰۴۲	۱۰۰۴۲
۱۹	۶۷۰۰	۱۱۵۰۰	۱۴۲۵۰	۱۰۸۱۶	۱۰۸۱۶
۲۰	۴۵۰۰	۱۱۰۰۰	۱۷۳۴۳	۱۰۹۴۴	۱۰۹۴۴
۲۱	۳۶۰۰	۱۱۲۵۰	۱۸۱۶۶	۱۱۰۰۵	۱۱۰۰۵
۲۲	۹۲۰۰	۱۲۲۵۰	۱۹۳۴۳	۱۳۵۹۴	۱۳۵۹۴
۲۳	۸۲۰۰	۱۳۲۵۰	۲۳۲۵۰	۱۴۹۰۰	۱۴۹۰۰
۲۴	۹۳۷۵	۱۰۲۵۰	۱۹۰۰۰	۱۲۸۷۵	۱۲۸۷۵


یافته و پس از استراحت مجدد در همان شب بالا می‌رود. این محققین عقیده دارند که میزان بالای اکسیژن خون هنگام فعالیت سگ در روز به عنوان یک «سد اکسیژن» در مویرگها عمل کرده و با ایجاد انقباضهای بازدارنده مانع ورود تعداد زیادی میکروفیلر به خون می‌شود. از طرف دیگر نشان داده شده است که رابطه‌ای بین زمان فعالیت پشه و ظهور حداکثر میکروفیلر در خون وجود دارد. در مورد دو فیلر وشرربیا بانکروفتی که میزان واسط آن کولکس فاتی جنس (Culex fatigans) و شبگز است حداکثر میکروفیلر موجود در خون در شب لوالوا که میزان واسط آن کربزوپس (Chrysops) و روزگز است حداکثر تعداد میکروفیلر در خون در روز وجود دارد (توماس، ۱۹۸۶؛ الیزابت و رایت، ۱۹۷۲) تاکنون بررسی درباره میزانهای واسط دیروفیلاریا ایمی تیس در ایران انجام نگرفته است اگرچه در دنیا انسواع پشه‌های آندس (Aedes)، کولکس، آنوفلز (Anopheles) و آرمیجرز (Armigeres) میزان واسط این فیلرهای هستند (اسلامی، ۱۳۷۶).

کلیه این پشه‌ها جز آرمیجرز از ایران گزارش شده است. مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا (له هان، ۱۹۹۱) و مشاهدات تجربی و روزمره در ایران نشان می‌دهد که این پشه‌ها شبگز هستند بنابراین به حداکثر رسیدن تعداد میکروفیلر

حداقل میکروفیلر در خون به ترتیب ساعت ۱۱ و ۸ صبح و حداکثر آن در ساعت ۳۰ و ۲۰ شب گزارش شده است. ظهور حداقل میکروفیلر در خون در سه برسی انجام گرفته قبل از ظهر بوده است که با بررسی حاضر (ساعت ۱۰ صبح) هماهنگی کامل دارد. ضمناً ظهور حداکثر میکروفیلر در کره و فرانسه به ترتیب ساعت ۲۱ و ۲۰ شب بوده است که شباهت زیادی با بررسی حاضر (ساعت ۲۳) دارد ولی در مطالعه‌ای که در تازانیا (نیمکره جنوبی) درباره تناوب‌داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمی تیس (ماتولا، ۱۹۹۱) انجام گرفت نشان داده شد که زمان ظهور حداقل و حداکثر میکروفیلر در خون در سگی که به مدت ۱۲۰ ساعت هر ساعت یکبار خونگیری شده بود دارای روند کاملاً مخالفی است و حداکثر میکروفیلر در خون در ساعت ۱۱ صبح و حداقل آن در ساعت ۲۲ شب مشاهده می‌گردد که کاملاً خلاف یافته‌های بررسی‌های بررسی حاضر و بررسیهای انجام گرفته در سایر کشورهای دنیا است.

تاکنون درباره تناوب ظهور میکروفیلر فیلرهای مختلف در خون فرضیه‌های زیادی ارایه شده است که شاید معتبرترین آنها رابطه بین میزان اکسیژن موجود در خون و ظهور میکروفیلر باشد. در یک بررسی (هاوکینگ و همکاران، ۱۹۶۳) نشان داده شد که تعداد میکروفیلر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون سگ هنگام شب و استراحت سگ، که میزان اکسیژن در خون کمتر است به حداکثر می‌رسد ولی اگر همین سگ به فعالیت واداشته شود تعداد میکروفیلر در خون کاهش





نمودار ۱- تعداد و میانگین میکروفیلر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون در هر ساعت شبانه روز

منابع

۱. اسلامی، ع. کرمشناسی دامپزشکی (جلد سوم : نماتودا و آکانتوسفالا). انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۷۶).
۲. Elizabeth. U. Canning and Wright. C. A. Behavioural Aspects of parasite transmission Academic press (53 , 62), (1972).
۳. Georgi, J. R. and Georgi M. Parasitology for veterinarians. W. B. Saunders company (306), (1990).
۴. Kennedy, C. R. Ecological Animal parasitology. Oxford London. Edixburgh. Melbourne (50), (1975).
۵. Lehane A. J. Biology of Blood sucking insects British library cataloguing in publication Data (173), (1991).
۶. Levine, N. D. Nematode parasite of Domestic Animals and of Man Burgess publishing company Minneapolis (488), (1968).
۷. Matola, Y. G. Periodicity of *Dirofilaria immitis* microfilariae in a dog from muheza district, Tanazania, Journal od Helminthology 65 : 1 , 76 - 78, (1991).
۸. Nemi, C. J. Veterinary Hematology. University of California Davis, California philadelphia (80), (1986).

دیروفیلاریا ایمی تیس در بررسی حاضر و در اکثر مطالعات انجام شده در دنیا در شب نوعی راهبرد انتخاب شده توسط فیلر برای ادامه نسل خود می باشد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از کمکهای آقای دکتر شاهرخ پهادری جهت تهیه و در اختیار گذاشتن سگ مورد آزمایش سپاسگزاری می نماید.

۹. Rhee, J. K. Yang, S. S. Kim, H. C. Periodicity exhibited by *Dirofilaria immitis* microfilariae identified in dogs of korea. Korean journal of parasitology 36 : 4 , 235 - 239, (1998).
۱۰. Soulsby, E. J. L. Helminths, Arthropods and protozoa of Domesticated Animals Balliere Tindall, london (307 , 308), (1986).
۱۱. Thomas , C. Cheng General prasitology (2nd edition) Medical University of south carolina charleston (597 - 599), (1986).
۱۲. Wharton, D. A. (1986). A Functional Biology of Nematodes The Johns Hopkins University press, Baltimor, Maryland.



Periodicity of *Dirofilaria immitis* in a dog from around in Tehran

Eslami, A.¹, Meshgi, B.¹

¹*Department of parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran - Iran.*

In order to study the periodicity of microfilaria of *Dirofilaria immitis* in a dog naturally infected with this parasite, blood samples are taken from saphen or cephalic vein in every hours of 3 consecutive days and night (72 times). The blood samples were examined by using modified knott method. Our finding revealed a nocturnal periodicity for *D. immitis*. The highest number of microfilariae was seen at 23 PM. and the lowest at 10 AM. The mean number of microfilariae in day time between 7 AM. to 18 PM. was 6693 comparing with 11906 at dark time of a day. (18 PM. to 7 AM).

Key words : Periodicity, Dog, *Dirofilaria immitis*.

