

# بررسی اکوکاردیوگرافی اسپیچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن

دکتر محمدقلی نادعلیان<sup>۱</sup> دکتر آریابدیعی<sup>۲</sup> دکتر محمدرضا مخبردزفولی<sup>۱</sup> دکتر خسرو لاله زاری<sup>۳</sup> دکتر ایرج نوروزیان<sup>۱</sup>

اولین اختلال دریچه‌ای که مورد مطالعه اکوکاردیوگرافیک قرار گرفت تنگی دریچه میترال (دولتی) بود و از آن زمان حرکات غیرعادی دیواره و نقایص مادرزادی توسط این روش مورد بررسی قرار می‌گیرد (۸).

نخستین بررسی اکوکاردیوگرافیک در اسب در سال ۱۹۷۷ توسط Piper صورت پذیرفت که در طی آن روش (Motion mode "M-mode") شرح داده شده است. تکنیک M-mode در حقیقت تصویر یک بعدی قلب بر محور زمان است. در این روش ساختارهای قلبی بر اساس حرکات موجی شکل اختصاصی خود شناخته می‌شوند (۸).

از اواسط دهه ۱۹۸۰ اکوکاردیوگرافی به روش دو بعدی تصاویر حاصل از این روش دو بعدی می‌باشند یعنی دارای یهنا و عمق هستند و تقریباً به هنگام وقوع، تصاویر ظاهر می‌شوند.

مدارک، باستان شناسی و ژنتیک نشان داده است که اسپیچه خزر نسل اول اسپهای خونگرم (Hot blood) جهان بوده است. براساس مدارک دیرینه شناسی در دوران هخامنشیان اسپیچه خزر جهت کشیدن اربابه‌های جنگی خصوصاً به هنگام شکار شیر به کار گرفته شده است. مهر سلطنتی در موزه بربیانی داریوش را بر اربابه‌هایی که دو جفت اسپیچه خزر در حال کشیدن آن هستند نمایش می‌دهد. این نژاد از دوران هخامنشیان تا سال ۱۹۶۵ میلادی که خانم لوئیز فیروز در کرانه‌های دریای خزر اسپیچه خزر را شناخته و معرفی نمود بخشی از زنجیره کم شده تکامل اسب محسوب می‌شد (۲). اسپیچه خزر دارای مشخصات پیشانی برآمده، گوشهای کوتاه (حداکثر ۴/۵ اینچ)، سمهای بیضی شکل، مفصل خرگوشی گاوی شکل و توانایی پرش فوق العاده می‌باشد (۲).

مقایسه موارد پاتولوژیک هر اختلال نیازمند اطلاع از حالات طبیعی آن ساختار است و این موضوع بویژه در بررسی اکوکاردیوگرافی حائز اهمیت است. لذا عدم حضور ابعاد استاندارد اکوکاردیوگرافی اسپیچه خزر انگیزه این بررسی را شکل داد.

## مواد و روش کار

الف- اسپهای مورد استفاده: در این بررسی از ۳۳ رأس اسپیچه خزر (۰ رأس مادیان، ۱ رأس اخته و ۱۲ رأس نریان) از سنین ۶ ماهه الی ۷ ساله و ۱۰ رأس تروبرد (۷ رأس مادیان، ۲ رأس اخته و ۱ رأس نریان) از سنین ۵ تا ۱۸ ساله جهت اکوکاردیوگرافی استفاده شد.

پس از اخذ سابقه و معاینات بالینی عمومی با توجه خاصی به نشانه‌های بیماریهای قلبی (آدم، نبض وadic، آریتمی و صدای مور مور) و تأیید سلامتی دام اندازه‌گیری دور سینه وارتفاع جدوگاه صورت می‌پذیرفت. دامهای سالم بدون استفاده از هیچ‌گونه مقید کننده شیمیایی یا فیزیکی و فقط با به کار گیری سربند (کلگی) در محیط اصطبل و یا پاره‌ای موارد در تراوای اسبی مورد معاینه اکوکاردیوگرافی قرار می‌گرفتند.

ب- اکوکاردیوگرافی: تصاویر اکوکاردیوگرافی با استفاده از دستگاه اکوکاردیوگرافی 200 Vet Pie Medical Scanner (کشور هلند) که توان بررسی همزمان 2-DE و M-mode را داشت صورت پذیرفت. ترانسیدیوسر به کار گرفته شده یک ترانسیدیوسر قطاعی با فرکانس ۳/۵ مگاهرتز و مکانیزم عمق نفوذی ۲۰ سانتیمتر بود.

(۱) گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(۲) دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(۳) دامپزشک بخشن خصوصی.

مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۵۶، شماره ۴، ۸۱-۸۴ (۱۳۸۰)

مطالعه حاضر بر روی تعداد ۳۳ رأس اسپیچه خزر (۰ رأس مادیان، ۱ رأس اخته و ۱۲ رأس نریان) از سنین ۶ ماهه الی ۷ ساله و ۱۰ رأس تروبرد (۷ رأس مادیان، ۲ رأس اخته و ۱ رأس نریان) از سنین ۵ الی ۱۸ ساله سالم بدون استفاده از مقید کننده شیمیایی یا فیزیکی صورت پذیرفته است. در این بررسی اسپهای به ۳ گروه اسپیچه‌های بالغ (بالای ۲ سال) اسپیچه‌های نابالغ (زیر دوسال) و اسپهای تروبرد بالغ تقسیم شده اند. اسپهای در حالت ایستاده با به کار گیری یک ترانسیدیوسر قطاعی مکانیکی ۳/۵ مگاهرتزی در دو طرف چپ و راست قفسه صدری در پشت بر جستگی آرنج با تغییر در جهت و زاویه ترانسیدیوسر مورد بررسی اکوکاردیوگرافی قرار می‌گرفتند. در ابتدا بررسی به روش 2-DE و سپس جهت اندازه‌گیری ابعاد قلبی به روش M-mode اکوکاردیوگرافی صورت می‌پذیرفت. اندازه‌گیری‌های اکوکاردیوگرافی براساس سیستم LELE صورت پذیرفت و ابعاد بطن چپ و راست، دیواره بین دو بطن و دیواره آزاد بطنهای در محدوده طنابهای لیفی در زیر دریچه دهلیزی بطی چپ و بالای عضلات پاپیلوی به گونه‌ای که محور تابش عمود بر دیواره بین بطنهای باشد در انتهای سیستول و دیاستول محاسبه می‌شدن. شاخصهای اکوکاردیوگرافی دریچه آئورت، دریچه میترال و دهلیز چپ نیز در سیستول و دیاستول مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری ابعاد کاردیوگرافی به دست آمده از سمت چپ قفسه صدری در اسپیچه‌های خزر و اسپهای تروبرد دارای وضوح کمتری نسبت به نماهای سمت راست قفسه صدری بودند. البته در مقام مقایسه بین نماهای سمت چپ در اسپیچه‌های خزر و تروبرد، نماهای حاصل از اسپیچه‌های خزر دارای وضوح بیشتری هستند. استفاده از ترانسیدیوسر ۳/۵ مگاهرتزی با عمق نفوذی حداقل ۲۰ سانتیمتر امکان اندازه‌گیری تمامی ابعاد قلب را در اسپیچه خزر از سمت قفسه صدری میسر می‌سازد لیکن اندازه‌گیری دیواره آزاد بطن چپ از سمت راست قفسه صدری در اسپهای تروبرد بزرگ با به کار گیری این ترانسیدیوسر میسر نیست. اختلاف معنی داری بین ابعاد دهلیز چپ، بطن چپ، بطن راست و آئورت در سیستول و دیاستول بین نژاد تروبرد و اسپیچه‌های خزر بالغ وجود دارد ( $P < 0.05$ ). اختلاف معنی داری بین ابعاد اکوکاردیوگرافی در اسپیچه خزر بالغ نر و ماده وجود ندارد. همبستگی بین قطر آئورت در دیاستول و قطر دهلیز چپ در سیستول و دیاستول در اسپیچه‌های خزر وجود دارد. همبستگی بین ابعاد اکوکاردیوگرافی اسپیچه‌های خزر بالغ و دور سینه و همچنین سن وجود ندارد. در این بررسی سه رأس از اسپهای تروبرد و یک رأس از اسپیچه‌های خزر بالغ دارای کنتراست خود به خودی بودند.

واژه‌های کلیدی: استاندارد، اکوکاردیوگرافی، 2-DE, M-mode.

اکوکاردیوگرافی روش تشخیصی بی‌خطروی است که در اثر انعکاس امواج اولتراسوند امکان بررسی کمی ابعاد قلبی شامل قطره حفرات قلبی، ضخامت دیواره‌ها، دریچه‌ها، قطر عروق بزرگ و بررسی کمی و کیفی انقباضات قلبی را میسر می‌سازد (۸). استفاده از امواج اولتراسوند از اوایل قرن نوزدهم میلادی توسط Galton آغاز گردید ولی برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ جهت امر تشخیص از امواج اولتراسوند استفاده شده است (۸). ارزش کاربردی اکوکاردیوگرافی در تشخیص بیماریهای قلبی به طور روز افزونی نمایانتر می‌شود.



نژاد تروبرد با استفاده از آزمون Student - T مورد مقایسه قرار گرفته است.

نماج

اکوکاردیوگرافی اسپچه‌های خزر بالغ و نابالغ و تروبرد در این بررسی با استفاده از روش‌های استاندارد اکوکاردیوگرافی توصیف شده توسط Patteson و Long انجام گرفته است و نتایج حاصله بر اساس اندازه‌گیری میانگین، واریانس، انحراف معیار، خطای انحراف معیار بررسی میانگین و ضریب واریانس توصیف آماری شده است (جدول ۱).

یافته‌های به دست آمده از پارامترهای اکوکاردیوگرافی اسپرهاي تروبرد با  
یافته‌های حاصله از اسپچه‌های خزر بالغ توسط آزمون Student- T مورد بررسی  
آمد. قاری قدرت و پارامترهای اختلاف LVs و RVs ، LVd ، RVd ، ADs ، LAS ، ADD ، LAd  
و IVSd,IVSs,LAWd,LAWs معنی دار ( $p < 0.05$  و  $t = 2.03 / 9.75$ ) و فاقد اختلاف معنی دار بودند (حدفا ۲).

همچنین ضریب همبستگی بین ابعاد اکوکاردیوگرافی به دست آمده و قطر ریشه آئورت در دیاستول در اسیچه‌های خزر از طریق محاسبه ضریب همبستگی (۲) مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت و قطر دهلیز چپ در دیاستول و سیستول دارای همبستگی ( $P < 0.05$ ) بوده ولی از روند خطی تعیین نمی‌شد. دیگر فاقد همبستگی هستند.

ضریب همبستگی (۲) بین اندازه‌های اکوکاردیوگرافی حاصله از این بررسی با دور سینه اسپیچه‌های خزر بالغ مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از پارامترهای مزبور دارایی همبستگی، با دور سینه نبودند.

ضریب همبستگی بین سن و پارامترهای مزبور در اسپیچه خزر بالغ مورد بررسی قرار گرفت و هیچ یک از پارامترهای مزبور دارای همبستگی با سن نبودند.

همچنین اختلاف بین جنس و ابعاد اکوکاردیو گرافی اسپیچه‌های خزر از طریق Student-T مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای مذبور در جنس نرو ماده دارای اختلاف معنی دار نبودند.

پخت

در این بررسی امکان اخذ تصاویر 2-DE و M-mode از تمام اسپیچه‌های خزر و اسپیچه‌های تروبرد از هر دو طرف چپ و راست قفسه صدری به روشهای استاندارد ذکر شده Voros (۹) و Long (۸) Piper (۵) امکان‌پذیر بود.

نماهای اکوکاردیوگرافی سمت چپ قفسه صدری دارای وضوح کمتری نسبت به نماهای سمت راست می‌باشند و این یافته با آنچه Long (۵) گزارش نموده است مطابقت دارد. در مقام مقایسه نماهای اخذ شده از سمت چپ در اسپیچه خزر دارای وضوح بیشتری از نماهای سمت چپ تروبرد می‌باشد. پنهانی کمتر قفسه صدری در اسپیچه‌های خزر می‌تواند علت این امر باشد.

جدول ۲- نتایج حاصله از آزمون Student-T مقایسه ابعاد قلبی در تروبرد و اسیچه خزر بالغ.

LAd	LAWd	ADd	LA <sub>s</sub>	LA <sub>Ws</sub>	ADs	RVd	IVSd
ti= ۰	۰/۹۲۶	۲/۳۰۴	۰/۴۳۲	۱/۹۲۲	۲/۸۰۶	۲/۵۲	۰/۸۷

(LAd) قطر داخلی حفره دهلیز چپ در پایان دیاستول، (ADd) قطر آئورت در دیاستول، (LAS) قطر حفره دهلیز چپ در پایان سیستول، (ADs) قطر آئورت در سیستول، (RVd) قطر حفره بطن راست در دیاستول، (LVd) قطر حفره بطن چپ در دیاستول، (RVS) قطر حفره بطن راست در سیستول، (LVs) قطر حفره بطن چپ در سیستول، (LAWs) قطر دیواره آزاد دهلیز چپ در سیستول، (LAWd) قطر دیواره آزاد دهلیز چپ در دیاستول، (IVSS) قطر دیواره بین بطنی در سیستول، (IVSd) قطر دیواره بین بطنی در دیاستول، (LVFS%) کوتاهی نسبی حفره بطن چپ.

پس از تراشیدن موهای طرف چپ و راست سینه در اسبچه های خزر و اسبهای تروبرد در محدوده ۱۵ سانتیمتر بالای برجستگی آرنج و در پشت عضله سه سر با استفاده از ژل اولتراسونیک تلاش در جهت گرفتن تصاویر اکوکاردیو گرافی در فضای بین دنده ای چهارم و پنجم صورت می پذیرفت. جهت سهولت کار، اندام حرکتی خلفی از فرد سونوگرافیست دورتر می شد تا فاصله ای بین آرنج و قفسه صدری دام ایجاد شود و در مواردی بویژه در اسبچه های خزر اندام حرکتی قدامی کمی به جلو کشیده می شد. در این بررسی اسبهای به سه دسته تروبرد ( بالغ ۱۰ رأس ) اسبچه های خزر بالغ ( ۲۶ رأس ) و اسبچه های خزر نابالغ ( ۷ رأس ) تقسیم بندی گردیدند.

در ابتدا نماهای محور طولی راست با روش 2-DE مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت ترانس迪وسر به گونه‌ای در دست چپ زیر انگشت شست قرار می‌گرفت که رأس قلب در قسمت چپ تصویر و قاعده در سمت راست تصویر نمایش داده می‌شد. گوشه فوقانی تصویر از قسمت راست قفسه صدری، سمت راست قفسه صدری و گوشه پایینی سمت چپ قفسه صدری را نشان می‌داد و بر عکس آن در اخذ تصویر 2-DE محور طولی چپ قفسه صدری حیورت می‌پذیرفت. در تصویر 2-DE نخست بطن چپ از نظر ظاهری و ساختار سپس بطن راست و دهلیز راست مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. سپس دریچه لته و دریچه دولتی از نظر ضخامت حرکت و لرزش مورد ارزیابی واقع می‌شد و پس از آن ریشه آئورت، دهلیز چپ مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. سپس با مدد مدلایت 2-DE تصویر M-mode از حفرات قلبی و دیواره‌ها و دریچه‌ها به گونه‌ای دیواره بین ذوبطن عمود بر جهت محور تابش باشد اندازه‌های ابعاد قلبی مورد محاسبه قرار می‌گرفت. قطر حفره بطنی راست و چپ، دیواره بین دو بطن بیواره آزاد بطن چپ بر اساس سیستم LELE در سیستول و دیاستول و با اندازه باز و بسته شدن دریچه دولتی صورت می‌پذیرفت. اندازه‌گیری سیستولیک قطر حفره بطن چپ بر اساس محل بر جستگی دیواره بین دو بطن صورت می‌پذیرفت. کوتاهی نسبی حفره بطن چپ از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$FS\% = \frac{LVDd - LVDs}{LVDd} \times 100$$

که در آن LVDs قطر حفره بطن چپ در پایان دیاستول و LVDd قطر حفره بطن چپ در پایان سیستول است. اندازه‌گیریهای دریچه میترال و آئورت بر اساس استانداردهای بیان شده مورد محاسبه قرار می‌گرفت.

ج - تحلیل آماری: داده‌های کمی حاصله از ابعاد قلبی با محاسبه دامنه، میانگین، انحراف معیار و خطای انحراف معیار توصیف آماری شده و ضریب همبستگی بین متغیرهای حاصله از اندازه‌های بطنهای، دهلیز چپ، دیواره بین بطنهای، دیواره آزاد بطنهای چپ و ... با ریشه آئورت محاسبه و محک آماری زده می‌شود. شاخصهای بدست آمده از اسپیچه‌های خزر بالغ و شاخصهای مشابه در

**جدول ۱ - خلاصه تخمین میانگین و واریانس ابعاد اکوکاردیوگرافی در جمعیت اسپچه خزر بالغ.**

$\mu$	$\sigma^2$	ابعاد فلبي
$2/4 \leq \mu \leq 2/44$	•/٢	LA d (Cm)
$3/5 \leq \mu \leq 4/19$	•/٤٢	AD d (Cm)
$1/8 \leq \mu \leq 2/12$	•/١٢	IVS d (Cm)
$2/88 \leq \mu \leq 3/0.7$	•/٢	IVS s (Cm)
$5/84 \leq \mu \leq 6/57$	١/١٢	LV d (Cm)
$3/22 \leq \mu \leq 4/11$	١/٠٤	LV s (Cm)
$39/4 \leq \mu \leq 0/14$	٥٩/٤	LV FS%

قطر حفره دهلیز چپ در پایان دیاستول، (ADD<sub>d</sub>(Cm)) قطر آئورت در پایان دیاستول، (IVS<sub>s</sub>( Cm )) قطر دیواره بین بطنه در پایان دیاستول، (IVS<sub>d</sub>( Cm )) قطر دیواره بین بطنه در پایان سیستول، (LVd( Cm )) قطر حفره بطنه چپ در پایان دیاستول، (LVFs% ) کوتاهی نسبی بطنه چپ.



### References

1. Bonagura, J.D. (1994): Echocardiography, JAVMA, 204: 522-546.
2. Firouz, L. (1973): Osteological and historical implication of Caspian miniature horse to early domestication in Iran in Matolcsi, J; (ed) symposium in Budapest.
3. Koramoto, K. (1990): Application of echocardiography for assessing left ventricular function of thoroughbred horse to resting stage. Vet. Bulletin 60, 1997, Abs 8520.
4. Lomgbard, C.W. (1984): Normal values of the canine M-mode echocardiogram. Am. J. Vet. Res. Vol 45. 2015-18.
5. Long, K.J; Bonagura, J.D. and Karke, P.G.G. (1992): Standardized imaging technique for guided M-mode and Doppler echocardiography in the horse. Equine. Vet. J. 24, 226-35.
6. Patteson, M.W. (1996): Equine cardiology. 1st edition. Blackwell Scientific Publication. Oxford.
7. Patteson, M.W (1996): Effect of sedation with Detomidine hydrochloride on echocardiography measurements of cardiac dimensions of cardiac function in horses. Equine. Vet. J. Sup. 19, 33-37.
8. Piper, F.S. and Hamlin, R.L. (1977): Echocardiography in the horse. JAVMA. 170, 518-819.
9. Voros, K; Holmes, J.R. and Gibbs, C. (1991): Measurement of cardiac dimension with 2-DE echocardiography in living horse. Equine:Vet. J.23, 461-5.

### Echocardiography and standardization of its parameter in Caspian miniature horse.

Nadalian, M.G.<sup>1</sup>, Badiei, A.<sup>2</sup>, Mokhber Dezfooli, M.R.<sup>1</sup>, Lalehzari, KH.<sup>3</sup>, Nowrouzian, I.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran – Iran. <sup>2</sup>Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran – Iran. <sup>3</sup>Private Veterinary Practitioner. J. Fac. Vet. Med. Tehran. Univ. 56, 4: 81-84, 2001.

Two dimensional (2-DE) and M-mode echocardiography were performed on 33 unsedated, healthy Caspian miniature and 10 thoroughbred horses. The groups comprised 26 adult, 7 young Caspian and 10 adult thoroughbred horses. Animals stood during examinations performed with a 3.5 MHz Mechanical sector transducer using various echocardiographic views. Images were recorded from the right and left sides of the thorax. 2-DE images were used to guide the placement of a cursor to obtain accurate M-mode recordings. The recommendations of the American Society of echocardiography were followed for all M-mode measurements. The leading edge method was used for all M-mode measurements. Right and left ventricular diameters, ventricular septa thickness (IVS) and ventricular free walls thickness were measured in chordal level with the axial beam prependicular to interventricular septum in end systole and end diastole. Echocardiographic parameters of mitral and aortic valves and

اختلاف ابعاد اکوکاردیوگرافی در نژادهای مختلف سگ گزارش شده است(۴). در اسب نیز این اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است . استاندارد اکوکاردیوگرافی اسپیچهای تربورد به روشهای M-mode و 2-DE وجود دارد(۱،۲،۳). ولی این استاندارد در خصوص نژادهای دیگر وجود ندارد.

اختلاف وزن، عملکرد، تمرین و خصوصیات و راشتی بین تربورد و اسپیچه خزر عامل وجود اختلاف معنی داری بین ابعاد قلبی ADs, LAs, ADD, LAd ، LAs ، LVd ، RVs ، LVs ، RVd

ضریب تغییرات (C.V) حفره بطن چپ در سیستول ، دیواره آزاد بطن چپ در سیستول و دیاستول ، قطر حفره بطن راست در سیستول و دیاستول و شاخصهای دریچه میترال بیشتر از ۱۵ درصد می باشد که به علت اختلاف زیاد وزن و جثه در نژاد اسپیچه خزر است زیرا این نژاد در حقیقت از دو زیر نژاد تشکیل شده است. اسپیچه های خزر با ارتفاع جدوجاه کمتر از ۱۱۰ سانتیمتر که عمدهاً جهت نمایش کاربرد دارند و اسپیچه های خزر با ارتفاع جدوجاه بیشتر از ۱۱۰ سانتیمتر که جهت سواری و ارابه رانی به کار گرفته می شوند.

قطر بطن راست به علت ساختار غیر دایره ای مقطع آن متغیر بوده و از آنجایی که به دور بطن چپ قرار گرفته است اندازه گیری این ساختار از فضاهای بین دندنهای دیگر، ابعاد متفاوتی را حاصل می نماید. در سگ، دم موجب افزایش حجم بطن راست می گردد (۴). اینکه در اسب نیز تنفس بر روی ابعاد قلبی تأثیرگذار است یا خیر، نامشخص می باشد.

شاخصهای دریچه میترال تحت تأثیر ضربان قلب، میزان جریان خون دریچه و وضعیت انقباضی بطنهاست و بنابراین تغییرات این شاخصها می تواند در اثر تحریک و هیجان در اسپیچه های خزر عصبی بیانگر علت زیاد بودن ضربیت تغییرات این شاخصها باشد.

با توجه به تعداد ۱۰۰ رأس اسپیچه خزر بالغ و دارای شناسنامه در کشور و بررسی اکوکاردیوگرافی در روی ۲۶ رأس می توان تخمین میانگین با درجه اطمینان ۹۷۵/۰ جهت اسپیچه خزر را توصیف نمود.

### تشکر و قدردانی

نگارندگان برخود فرض می دانند که از شورای پژوهشی دانشگاه تهران که هزینه طرح را پرداخت کردن و همین طور از آقای دکتر گیلانپور معاونت محترم پژوهشی دانشکده تشکر و قدردانی نمایند.



left atrium were calculated end systole and diastole. Using a 3.5 MHz probe, the quality of recording were adequate for quantitative and qualitative examinations. In Caspian miniature horses images obtained from the left side were of poorer quality than those obtained from the right. Summary statistics for each dimensions were determined including the range, mean, standard deviation, standard errors of mean and coefficient of variance. Significant differences between mean value of cardiac dimensions in adult Caspian miniature and thoroughbred horses were determined using The student-T test ( $P<0.05$ ). No correlation was found between the measurement taken and heartgirth in adult Caspian miniature horses. There was no significant difference between the measurements in males and females adult Caspians using a student-T test( $P<0.05$ ). No linear correlation was found between the measurement taken and age in adult Caspian miniature horses. Measurements of the left atrial diameter in the adult Caspian correlated with aortic diameter in diastole. Spontaneous contrast were determined in one adult Caspian and 3 thoroughbred horses.

**Key words:** Standard, Echocardiography, M-mode, 2-DE, Caspian miniature horse.

