

## بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی‌های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر

محمد رضا مخبر دزفولی<sup>۱\*</sup> دامون انصاری<sup>۲</sup> علی حسن پور<sup>۳</sup> محمد قلی نادعلیان<sup>۱</sup> حسام الدین سیفی<sup>۴</sup> صمد لطف الله زاده<sup>۱</sup> رضا راه چمنی<sup>۲</sup>

(۱) گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(۲) دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(۳) گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز- ایران.

(۴) گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی، مشهد- ایران.

(دریافت مقاله: ۱۷ آذرماه ۱۳۸۷ ، پذیرش نهایی: ۱۲ مهرماه ۱۳۸۸)

### چکیده

زخم معده یکی از بیماری‌های شایع در میان اسبان مسابقه و کره اسبان می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی حضور آریتمی قلبی در اسبان مبتلا به زخم معده و ارتباط احتمالی بین این دو عارضه بود. جهت بررسی وضعیت فعالیت قلبی و مشخصات الکتروکاردیوگرافی در اسب‌های عرب و اسبچه خزر مبتلا به زخم معده، تعداد ۱۳ رأس اسبچه خزر و ۸ رأس اسب عرب مورد مطالعه قرار گرفت. در ۱۳ رأس (۶۲ درصد) اسب‌های مورد مطالعه زخم معده مشاهده شد. در ۱۲ رأس (۵۷ درصد) آریتمی قلبی تشخیص داده شد و در ۹ رأس (۴۳ درصد) ریتم فعالیت قلبی منظم و طبیعی بود اندواع آریتمی‌های قلبی عبارت بودند از: تاکیکاردنی سینوسی، آریتمی سینوسی، برادیکاردنی سینوسی، بلوک درجه ۲ دهیلزی- بطیعه و بلوک سینوسی- دهیلزی. رابطه معنی داری بین وقوع زخم معده و بروز آریتمی و همچنین وقوع زخم معده و هر یک از آریتمی‌های ذکر شده مشاهده نگردید. مقادیر سرمی الکتروولیت‌ها (کلسیم، منیزیم، فسفر، سدیم، پتاسیم) در همه اسب‌های مورد مطالعه نیز در محدوده طبیعی قرار داشته و ارتباط معنی داری با بروز آریتمی قلبی و رخداد زخم معده نشان نداد. با این‌که ارتباط معنی داری بین وجود زخم معده و آریتمی‌های قلبی وجود نداشت ولی بروز بیشتر برخی از انواع آریتمی‌های قلبی در اسب‌های مبتلا به زخم معده قابل تأمل است.

واژه‌های کلیدی: اسب، آریتمی، زخم معده، اسب عرب، اسبچه خزر.

اسب عرب بود. شش رأس از اسب‌های مورد مطالعه نریان (۴ رأس عرب و ۲

رأس اسبچه خزر)، ۱۳ رأس مادیان (۹ رأس عرب و ۴ رأس اسبچه خزر) و ۲ رأس

اخته (هر دو اسبچه خزر) بودند. میانگین سنی اسب‌های عرب ۸/۷۵ و اسبچه‌ها ۸ سال و میانگین سنی کل اسب‌های مورد مطالعه ۸/۲۵ سال بود. تمامی اسب‌های عرب برای سواری مورد استفاده قرار می‌گرفتند ولی در مسابقه خاصی شرکت نداشتند. اسبچه‌های خزر به جز یک مورد که در مسابقه مخصوص این گونه شرکت کرده بود هیچ یک برای سواری یا کار دیگری استفاده نمی‌گردید. همه اسب‌های مورد نظر در جایگاه انفرادی و تحت شرایط مطلوب بهداشتی و پرورشی نگهداری می‌شدند و بسته به فعالیت، جیره‌ای شامل یونجه خشک، جو، کنسانتره و هویج تازه دریافت می‌کردند.

هر یک از اسب‌ها قبل از انجام اندوسکوپی و الکتروکاردیوگرافی معاینه بالینی شده و از نظر سلامت ظاهری بررسی شدند. هیچ‌کدام از اسب‌های مورد مطالعه در معاینه بالینی تب نداشتند و نشانه‌ای دال بر وجود بیماری خاصی از خود نشان ندادند و صدای اسب‌های قلبی در همه موارد طبیعی بود.

شانزده ساعت قبل از انجام اندوسکوپی برای خالی ماندن معده پرهیز غذایی داده شد. جهت ثبت الکتروکاردیوگرام پس از مهار اسب در محل مخصوصی به مدت ۱۰ دقیقه صبر کرده تا شرایط محیطی و افزایش ضربان قلب ناشی از فعالیت و استرس تاحد ممکن کاهش یابد. ثبت الکتروکاردیوگرام در اشتقاق قاعده‌ای- راسی انجام گرفت، در این اشتقاق الکتروود مثبت در قاعده قلب موازی با آرنچ و در پنجمین فضای بین دنده‌ای و الکتروود منفی در یک سوم پایینی ناوдан و داجی قرار گرفت. آنگاه الکتروکاردیوگرام با سرعت ۲۵ میلیمتر در

### مقدمه

زخم معده در اسب یک مشکل جهانی است. شیوه زخم معده در کره اسب‌های زیر ۶۰ روز ۲۵-۵۰ درصد و در اسب‌های مسابقه ۸۰-۹۰ درصد گزارش شده است (۱۶). وهمکاران در سال ۲۰۰۴ نشان دادند در ۳۰-۴۰ درصد اسب‌های مسابقه‌های استقامت پس از مسافت ۸۰-۵۰ کیلومتر رضایعات مخاط معده اتفاق می‌افتد (۹). علاوه بر روش‌های پیشگیری مشخصی چون تغییر جیره به نفع گیاهان مرتعی و فیبر بالا، کاهش تعداد مسابقه‌ها و به حداقل رساندن عوامل استرس زائی مثل حمل و نقل در جلوگیری از زخم معده مورد توجه می‌باشد (۹). در گاو ارتباط بین بروز آریتمی‌های قلبی و اختلالات دستگاه گوارش کاملاً شناخته شده است و به هم خودن مقادیر الکتروولیت‌ها، توازن اسید و باز و یا فعالیت غیر طبیعی سیستم عصبی خودکار ناشی از اختلالات گوارشی از علل بروز آریتمی‌های قلبی است (۴،۵،۶). در اسب بر اساس مطالعات انجام شده علل انواع آریتمی‌های قلبی که در بیماری‌های دستگاه گوارش بروز می‌کند عبارتند از: اثر مستقیم اندوتوكسین‌ها بر روی میوکارد قلب، اختلال عملکرد اعصاب به علت اتساع معده و روده‌ها، اختلال الکتروولیتی و عدم تعادل اسید و باز (۸،۱۲). با توجه به این‌که اطلاعات دقیقی در رابطه با اثر زخم معده در بروز آریتمی‌های اسب وجود ندارد، مطالعه حاضر جهت بررسی این موضوع در اسب‌های نژاد عرب و اسبچه خزر طراحی گردید.

### مواد و روش کار

اسب‌های مورد مطالعه در این مطالعه شامل ۱۳ رأس اسبچه خزر و ۸ رأس



جدول ۲- میانگین نتایج حاصل از آزمایش‌های هماتولوژیک در دو نژاد مورد مطالعه.  
(Mean $\pm$ SE)

Mono (%)	Eos (%)	Lymph (%)	Neut (%)	PCV	WBC (%)	نژاد
۲/۳ $\pm$ ۰/۳	۴/۸ $\pm$ ۱/۵	۲۰ $\pm$ ۴/۶	۷۳/۸ $\pm$ ۴/۳	۷/۵ $\pm$ ۰/۷	۳۶/۵ $\pm$ ۱/۸	عرب
۲/۰۸ $\pm$ ۰/۱۵	۲/۵ $\pm$ ۰/۰۶	۳۵/۳ $\pm$ ۷/۱	۶۰/۳ $\pm$ ۶/۹	۷/۴ $\pm$ ۰/۴	۳۸/۷ $\pm$ ۱/۸	اسپچه خزر

تحقیق حاضر با استفاده از آزمون آماری تی- استودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

## نتایج

از مجموع اسب‌های مورد مطالعه ۱۳ مورد (۷ رأس اسپچه خزر و ۶ رأس عرب) دارای زخم معده و درجه ای از التهاب و رأس سالم بودند. ۸ مورد از زخمهای (۶ درصد) در ناحیه مارگو پلیکاتوس و ۵ مورد (۳۸ درصد) در ناحیه غیر غده‌ای معده دیده شد. همه زخمهای بدون خون‌ریزی و دارای التهاب و پرخونی بودند. میانگین سنی اسب‌های دارای زخم ۸/۴۶ سال و میانگین سنی اسب‌های سالم ۸/۲۵ سال بود. تفاوت معنی داری از نظر توزیع سن و جنس بین اسب‌های سالم و دارای زخم وجود نداشت. تعداد ضربان قلب از ۲۲ تا ۱۰۲ ضربه در دقیقه متفاوت بود (میانگین ۴۱ و انحراف معیار ۱۷). توزیع ریتم قلبی در ۲۱ رأس اسب مورد مطالعه صرف نظر از گونه دامی وجود یاد نمود. وجود زخم معده به شرح زیر بود:

تعداد ۹ رأس از اسب‌ها دارای ریتم سینوسی طبیعی بودند و هیچ گونه آریتمی نشان ندادند. تعداد ۴ رأس تاکیکاردی سینوسی، ۳ رأس آریتمی سینوسی، ۱ رأس بلوک سینوسی- دهلیزی، ۲ رأس بلوک دهلیزی- بطئی درجه ۲، ۱ رأس آریتمی سینوسی توام با بلوک درجه ۲ دهلیزی- بطئی و ۱ رأس برا دیکاردی را بروز دادند. بلوک دهلیزی بطئی درجه ۲ از نوع ونکباخ بود. وضعیت اسب‌های مبتلا به زخم معده و سالم از نظر ابتلاء به آریتمی‌های مختلف در جدول یک آمده است.

نتایج حاصل از آزمایش‌های هماتولوژیک، بیوشیمیایی و همچنین معیارهای مورد استفاده برای بررسی نتایج کتروکاردیوگرافیک به ترتیب در جداول ۲ و ۳ و نشان داده شده است.

آنالیز آماری نشان داد اختلاف معنی داری از نظر مقادیر سرمی کلسیم، فسفر غیر معدنی، منیزیم، سدیم و پتاسیم بین دو گروه اسب‌های مبتلا به زخم معده و سالم وجود ندارد.

## بحث

اختلالات ریتم قلب در اسب بیش از سایر دام‌های اهلی گزارش شده است (۱۶). با این‌که در صد بالایی از اختلالات ریتم قلب در اسب مشاهده شده است ولی خوشبختانه بیشتر آریتمی‌های دام فیزیولوژیک بوده و در اثر فعالیت بدنه به راحتی بر طرف می‌شوند. در اسب بالا بودن تونوستیته عصب واگ به عنوان عامل مهم در ایجاد تعدادی از آریتمی‌های قلبی که به آن‌ها

جدول ۱- انواع آریتمی‌های قلبی ثبت شده در اسب‌های مورد بررسی در این مطالعه.

نوع ریتم	تعداد	درصد	جنس		نژاد		بیماری
			مرد	زن	مرد	زن	
سالم	معده	عرب	خر	اسپچه	خر	نژاد	نژاد
ریتم منظم	۹	۴۲/۸	۲	۷	۵	۴	۶
تاکیکاردی سینوسی	۴	۱۶/۳	۱	۳	۱	۳	۱
آریتمی سینوسی	۳	۱۴/۳	۱	۱	۱	۲	۱
برادیکاردی سینوسی	۱	۴/۸	-	۱	-	۱	-
بلوک AV درجه ۱	۰	-	-	-	-	-	-
بلوک AV درجه ۲	۳	۱۴/۳	۲	۲	۱	۱	۲
بلوک سینوسی- دهلیزی	۱	۴/۸	-	۱	۱	-	۱
جمع	۲۱	۱۰۰	۱۳	۸	۱۳	۲	۸
درصد	-	-	۶۲	۳۸	۶۲	۲۹	۳۸

ثانیه و اشتتقاق دستگاه و حداقل به مدت ۳۰ ثانیه ثبت شد. قبل از ثبت الکتروکاردیوگرام از اسب‌های مورد نظر ۱۰ میلی لیتر خون ازورید و داج گرفته شد که ۳ میلی لیتر آن به لوله حاوی ماده ضد انعقاد EDTA جهت آزمایش‌های هماتولوژی و ۷ میلی لیتر به لوله بدون ماده ضد انعقاد جهت جدا سازی سرم و انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی منتقل شد. اندوسکوپی به دلیل نیاز به استفاده از داروهای آرام بخش، پس از ثبت ECG انجام می‌گرفت لذا کلیه یافته‌های الکتروکاردیوگرافی بدون استفاده از داروهای آرام بخش و در شرایط استراحت طبیعی دام حاصل شده است. آنگاه حیوان به روش مقید کردن شیمیایی و با استفاده از داروهای آسپرومایزین (۰/۰۰۲ میلیگرم بر کیلوگرم) و زایلazin (۰/۰۳۲ میلیگرم بر کیلوگرم) که درورید و داج تزریق می‌شد برای اندوسکوپی آماده می‌گردید. حدود ده دقیقه بعد از تزریق داروهای آرام بخش و بعد از لوشه زدن عمل اندوسکوپی انجام می‌گرفت. اندوسکوپ به طور معمول به داخل مری و سپس معده پیش برده می‌شد و با میدن هوا از طریق اندوسکوپ معده متسع می‌گردید. این عمل تا حدی صورت می‌گرفت که منطقه غده‌ای و غیر غده‌ای را بتوان مشاهده کرد. اتساع معده توسط هوا به خوبی تحمل شده و در کره‌ها و بالغین با اثرات منفی همراه نبود. نمونه‌های اخذ شده در کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه جهت جدا سازی سرم ارجاع داده می‌شد و سپس برای اندازه‌گیری به آزمایشگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال می‌گردید. مقادیر سرمی کلسیم و فسفر با دستگاه اتو آنالایزر (کارخانه هیتاچی، ژاپن)، سدیم و پتاسیم با دستگاه نورستج شعله‌ای (کارخانه هیتاچی، ژاپن) و میزیم با دستگاه جذب نوری اندازه‌گیری گردید. الکتروکاردیوگرام‌های بدست آمده از نظر شکل و طول مدت موج P، فاصله P-R، شکل، دامنه و طول مدت موج QRS، فاصله Q-T و ارتفاع موج T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش‌های هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون و نیز معیارهای مورد استفاده برای تفسیر الکتروکاردیوگرام‌های به دست آمده در



جدول ۳- میانگین نتایج حاصل از آزمایش های بیوپتیمیابی سرم خون اسب های دو نژاد مورد مطالعه (Mean±SE).

نژاد	پروتئین تام (g/dl)	فیبرینوژن (mg/dl)	کلیسم (mg/dl)	فسفر (mg/dl)	متیزیم (mg/dl)	سدیم (mEq/lit)	پتابسیم (mEq/lit)
عرب	۷/۲±۰/۱	۲۲۵±۴۸/۹	۱۰/۸±۰/۴	۲/۷±۰/۳	۱/۶±۰/۱	۱۳۶/۲±۲	۴/۱±۰/۲
اسپیچه خزر	۷/۳±۰/۴	۲۹۲/۳±۶۸/۲	۱۰/۶±۰/۲	۲/۹±۰/۳	۱/۷±۰/۱	۱۳۶/۴±۱/۵	۴/۱±۰/۲

جدول ۴- میانگین معیارهای مورد استفاده در الکتروکاردیوگرافی در اسب های دو نژاد مورد مطالعه (Mean±SE).

نژاد	ا'P-amp	ا'QRS-a	P-du	'T- amp	'P-R- int	'QRS-d	'QT-in
عرب	۰/۳±۰/۰۳	۱/۸±۰/۰۳	۱/۱±۰/۰۲	۰/۱±۰/۰۱	۰/۴±۰/۰۴	۰/۱±۰/۰۱	۰/۴±۰/۰۲
اسپیچه خزر	۰/۲±۰/۰۵	۱/۵±۰/۰۲	۰/۹±۰/۰۱	۰/۱±۰/۰۱	۰/۲±۰/۰۲	۰/۱±۰/۰۱	۰/۳±۰/۰۵

سینوسی مرضی به طور ثانویه هستند و مواردی از قبیل نارسایی احتقانی قلب، از جمله عوامل مسبب تاکیکاردی مرضی اولیه می باشند. در این مطالعه از ۴ مورد تاکیکاردی سینوسی ۳ مورد آن در اسپیچه خزر و یک مورد آن در اسب عرب تشخیص داده شد. از این موارد سه مورد در اسب های دارای زخم معده بود (دو مورد اسپیچه خزر مبتلا به زخم معده و یک مورد اسب عرب مبتلا به زخم معده). با توجه به این که ۷۵ درصد موارد تاکیکاردی سینوسی در اسب های مبتلا به زخم معده بود، ارتباط آن با بروز درد از یک سو و خونریزی و کم خونی از سوی دیگر می تواند مطرح باشد. مطالعات هماتولوژیک تغییرات معنی داری بین اسب های مبتلا به زخم معده و سالم نشان نداد (جدول ۲) و به همین دلیل احتمال سبب شناسی در دربروز این تاکیکاردی محتمل تر است. درد محوطه شکمی بوسیله فیبرهای سمپاتیک سیستم عصبی خودکار به سیستم اعصاب مرکزی منتقل می شود. تحریک سیستم عصبی سمپاتیک باعث تغییراتی در ارگان های مختلف از جمله در قلب شده و موجب افزایش تعداد (تاکیکاردی سینوسی) و قدرت ضربان قلب می گردد. این درد می تواند ناشی از وجود زخم در دستگاه گوارش، کشیدگی دیواره دستگاه گوارش و یا ناشی از واسطه های آمامی باشد<sup>(۹)</sup>.

یک مورد بلوك سینوسی - دهليزي در اسپیچه خزر تشخيص داده شد. اگر چه میوکاردیت های شدید، انفارکتوس، فیبروز دهليزي و مصرف داروهایی نظیر کوئینیدین و مسمومیت با مقادیر کم خرزه ره از جمله علل مرضی این نوع بلوك قلمداد شده اند لیکن با توجه به سلامت دام و نبود هیچ گونه علامتی دال بروجود بیماری در اسپیچه خزر مذکور و همچنین نبود زخم معده به نظر می رسد نقش عصب واگ اصلی ترین عامل بروز چنین اریتمی در این اسب است.

در سه مورد از اسب های مورد مطالعه بلوك درجه ۲ دهليزي - بطئی تشخیص داده شد. که دو مورد آن در اسب های دارای زخم معده (یک راس اسپیچه خزر و یک راس اسب عرب) بود. مطالعات همودینامیک نشان داده است که این نوع بلوك از اثر افزایش پیشرونده در پیک آنورتی بروز بعضی ضربان های قلب ناشی می شود به طوری که بارور سپتوروهای دیواره آنورت و جسم کاروتید باعث تحریک واگی شده و یک ضربان مهار شده تا فشار خون

آریتمی های با واسطه واگ (vagal mediated arrhythmias) گفته می شود مورد قبول مختصمان می باشد<sup>(۱۲)</sup>.

در این مطالعه بیشترین آریتمی مشاهده شده تاکیکاردی سینوسی ۱۹ درصد، آریتمی سینوسی ۳/۴ درصد و بلوك درجه ۲ دهليزي - بطئی ۳/۴ درصد بود که با نتایج اکثر منابع همخوانی دارد. در مطالعه RezaKhani و Bidgholi در سال ۱۳۸۰ بیشترین آریتمی های اسبان به ظاهر سالم تاکیکاردی سینوسی ۱۵ درصد، آریتمی سینوسی ۵/۷ درصد، آریتمی سینوسی همراه با بلوك درجه ۲ دهليزي - بطئی ۵ درصد و بلوك درجه ۲ دهليزي - بطئی ۵ درصد گزارش شد<sup>(۱۴)</sup>. در مطالعه RezaKhani و همکاران در سال ۱۳۸۴ بیشترین آریتمی های مشاهده شده در اسبان به ظاهر سالم بلوك درجه ۲ دهليزي - بطئی ۹/۳۶ درصد، آریتمی سینوسی ۵/۵ درصد و تاکیکاردی سینوسی ۵/۵ درصد (۱۵). در یک مطالعه طی الکتروکاردیوگرافی ۲۴ ساعته ۴۴ درصد اسب های نرمال دارای بلوك دهليزي - بطئی درجه ۲، ۱۰ درصد دارای آریتمی سینوسی، ۳ درصد دارای بلوك سینوسی - دهليزي، ۲۷ درصد دارای ضربان های زودرس فوق بطئی اتفاقی و ۱۵ درصد دارای آریتمی های بطئی اتفاقی بودند<sup>(۱۶)</sup>.

از مجموع ۲۱ راس اسب که تحت اندوسکوپی قرار گرفته و الکتروکاردیوگرام ثبت شد در ۳ مورد (۳/۴ درصد) آریتمی سینوسی تشخیص داده شد. آریتمی سینوسی یک آریتمی فیزیولوژیک و نرمال بوده و بیشترین علت آن تونوسیته عصب واگ می باشد. در مطالعات دیگر شیوع آریتمی سینوسی در اسبان به ظاهر سالم ۱۰ درصد (۱۶) و ۷/۵ درصد (۱۶) گزارش شده است.

در ۴ مورد تاکیکاردی سینوسی مشاهده گردید. تاکیکاردی سینوسی را به انواع فیزیولوژیک و مرضی تقسیم بندی کرده اند. تاکیکاردی سینوسی فیزیولوژیک در اثر عواملی همچون فعالیت بدنه، تهییج، اضطراب، درد، هیپرتومی، کاهش فشار خون سرخرگی و تزریق داروهای آدرنرژیک ایجاد می شود. تاکیکاردی مرضی ممکن است به شکل ثانویه در اثر بیماری های عمومی یا به شکل اولیه در اثراختلالات اختصاصی خود قلب پدید آید. تب، هیپوکسی، خونریزی و کم خونی از عوامل بوجود آور نده تاکیکاردی



## References

- Holmes, J. R. (1980) Cardiac rhythm irregularities in the horse. In Prac. 3:15-25.
- Marr, C.M. (2004) Cardiac emergencies and problems of the critical care patient. Vet. Clin. North Am. (Equine Prac). 20:217-230.
- McGuirk, S. M., Muir, W.W. (1985) Diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias. Vet.Clin.North Am. (Equine Prac). 1:353-369.
- Mokhber Dezfooli, M. R., Soifi, H. (1997) Atrial fibrillation followed by left displacement of obomasum in a dairy cattle. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 51: 127-129.
- Mokhber Dezfoul, M. R., Nadalia, M. Gh., Rezakhani, A., Noroozian, I., Sohrabi Haghdoost, I. (1998) Clinical, hematologic, biochemical and Electrocardiographic study of displacement of abomasal in dairy cattle in Tehran district. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 52: 65-80.
- Mokhber Dezfooli, M.R., Dalir naghadeh, B., Mortaz, A. (2001) The role of Electrolyte in cardiac arrhythmic of cows. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 55: 63-68.
- Moore, J.N. (1990) Pathophysiology of circulatory shock. In: The Equine Acute Abdomen. Edited by A.W. Nathaniel, Teton New Media, USA. pp. 90.
- Myerburg, R.J., Kessler, K.M., Castellanos, A. (1998) Recognition, clinical assessment and mangment of arrhythmias and conduction disturbances. In: The heart, arteries and veins. Edited by R.W. Alexander, R.C. Schlant, V.O. Fuster, R.A. Rourke, R. Robert, E.H. Sonnenblick, S. Hurst, (9<sup>th</sup>ed). McGraw-Hill company. UK. pp. 873-941.
- Neito, J. E., Snyder, J. R., Beldomenico, P., Aleman, M., Kerr, J.W., Spider, S.J. (2004) Prevalence of gastric ulcers in endurance horses-a preliminary report. Vet. J.167:33-37.
- Petsien, M. D. (2000) Equine Cardiology, Translated Reza khani, A and Rezaeian, GH, Shiraz University Press, pp. 289-301.
- Radostitis, O. M., Gay, C. C., Hinchklif K. W., Constable, P. D. (2007) Veterinary Medicine. (10<sup>th</sup>ed.), WB saunders company. London, UK. pp. 237-416

دوباره تعديل شود. این بلوک می تواند در گره SA یا AV باشد اما چون انقباض بطن ها عامل تعیین کننده فشار خون است بلوک AV معمول تر است. وقتی HR افزایش می یابد مهار و اگر باعث حذف بلوک و آریتمی می شود. تریق آتروپین که سیستم پاراسمپاتیک را غیرفعال می کند نیز اثری مشابه دارد(۱). کما این که در منابع نیز بلوک درجه ۲ دهليزی- بطئی در ۹۰ درصد موارد فيزيولوژیک قلمداد شده است مگر این که نشانه های کاهش کارابی قلبی و بروز دیسترس تنفسی و ناتوانی در تمرین دام مشاهده گردد(۱۱). از جمله علل مرضی این نوع بلوک می توان به اختلال در تجویز دهليزی- بطئی ناشی از به هم خوردن توازن الکتروولیت، زیاده روی در تجویز نمک های کلسیم، مسمومیت با دیژیتالین ها، کاربومیوپاتی و میوکاردیت های توام با بیماری های تغذیه ای و عفونی اشاره کرد(۱۲).

تغییر در غلظت الکتروولیت های خون یکی از علل آریتمی قلبی در انسان و دام است(۶،۱۰). در این مطالعه غلظت الکتروولیت های سرم در محدوده نرمال بود. بدین ترتیب بار دیگر از علل مرضی آریتمی باید سایر علل آریتمی از جمله فيزيولوژیک بودن آریتمی های مورد مشاهده مد نظر قرار گیرد.

- Rezakhani, A., Aslani, M.R. (1992) Sinoatrial block in horse. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 3: 53-58.
- Rezakhani, A., Cheema, A.H., Edjtehadi, M. (1997) Second degree A-V block and sarcosporidiosis in sheep. ZbL. Vet. Med. A. 24:258-262.
- Rezakhani, A., Bidgoli, R. (2002) Study on the frequency of cardiac arrhythmia in horses in Tehran district. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 56: 47-56.
- Rezakhani, A, Mokhber Dezfooli, M.R., Goudarzi, M., Ansari Fari, M. (2006) Study on the frequency of Cardiac dysrrhythmia in asymptomatic horses in horne riding clubs (Shiraz, Esfahan and Tehran). J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 60:225-228.
- Smith, B.P. (2002) Large Animal Internal Medicine, Mosby publications, St. Louise, Philadelphia,USA. pp.90, 617.



# STUDY ON POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN GASTRIC ULCER AND CARDIAC ARRHYTHMIAS IN THE ARAB HORSE AND CASPIAN MINIATURE HORSE

Mokhber-Dezfouli, M.R.<sup>1\*</sup>, Ansari, D.<sup>2</sup>, Hasanpour, A.<sup>3</sup>, Nadalian, M.G.<sup>1</sup>, Seifi, H.A.<sup>4</sup>, Lotfollahzadeh, S.<sup>1</sup>, Rahchamani, R.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.*

<sup>2</sup>*Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.*

<sup>3</sup>*Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz-Iran.*

<sup>4</sup>*Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University, Mashad-Iran.*

(Received 7 December 2008 , Accepted 5 October 2009)

## **Abstract:**

Peptic ulcer is a very common disorder in horse race and foals. In the present research possible relationship between gastric ulcer and the prevalence of cardiac arrhythmia were studied in two different horse race. In this respect, 13 Caspian miniature horses and 8 Arab horses were studied. Gastric ulcers and cardiac arrhythmias were diagnosed in 13 horses (62%) and 12 (57%) out of 211 horses, respectively. The observed cardiac arrhythmias were sinus tachycardia, sinus bradycardia, sinus arrhythmia, second degree AV block and SA block. There was no significant relationship between gastric ulcer and cardiac arrhythmia in general and between gastric ulcer and each kind of arrhythmia ( $p>0.005$ ). Serum calcium, potassium, sodium, magnesium and inorganic phosphorous concentrations were measured in the horses. No significant correlation was seen between serum electrolyte and gastric ulcer or cardiac arrhythmia. Despite lack of significant correlation between cardiac arrhythmia and gastric ulcer, more occurrence for some kinds of arrhythmia in affected horses with gastric ulcer was very interesting and need to be further investigated in future.

**Key words:** horse, arrhythmia, gastric ulcer, Arab horse, Caspian miniature horse.

\*Corresponding author's email: mokhberd@ut.ac.ir, Tel:021-66923748, Fax:021-66933222

