

تأثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا بر ریخت‌شناسی غده تیروئید جوجه‌های گوشتی

مسعود ادیب مرادی

گروه علوم پایه دانشگاه دامپژوهشی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(دریافت مقاله: ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۵، پذیرش نهایی: ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۶)

چکیده

به منظور بررسی سطوح مختلف کنجاله کانولا بر ریخت‌شناسی غده تیروئید جوجه‌های گوشتی ۳۰۰ قطعه جوجه‌گوشتی نر سویه راس (Ross) در پنج تیمار (هر تیمار شامل چهار تکرار و در هر تکرار ۱۵ قطعه) مورد بررسی قرار گرفته است. کنجاله کانولا در بنج سطح (۱۵، ۱۰، ۵ و ۰ درصد) از یک روزگی تا پایان دوره ۴۲ که روزگی بود در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. در پایان دوره از هر تکرار ۴ قطعه جوجه با وزنی در محدوده ۰-۱۵ گرم بافت اندامی و خارج کردن تیروئید نمونه‌ها بالا فاصله در محلول بوئن قرار گرفته و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. سپس مراحل معمول بافت‌شناسی درستگاه پاسازی بافت انجام و از نمونه‌ها برش‌هایی به ضخامت ۶ میکرون توسط میکروتوم تهیه گردید. برش‌های نمونه به روش هماتوکسیلین و اوزین رنگ امیزی و مورد مطالعه هیستومورفولوژیک (تعداد سلول‌های اپیتلیال، ارتفاع اپیتلیوم فولیکول‌ها و قطر آنها) قرارداده شدند. پس از اتمام مراحل آزمیش، داده‌های گردآوری شده با استفاده از بسته نرم‌افزاری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت مقایسه میانگین‌های به دست آمده از آزمون مقایسه میانگین چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۰/۰۱ استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان از افزایش ارتفاع اپیتلیوم، قطر و تعداد فولیکول‌های غده تیروئید با افزایش سطح استفاده از کنجاله کانولا در جیره داشت ($p < 0.01$) بنظر می‌رسد که علیرغم اصلاح ژنتیکی کانولا و کمبینه کردن گلیکوزینولات‌های در این ماده خوارکی، باز هم استفاده از کنجاله کانولا در جیره طیور گوشتی سبب تغییرات بافتی زیادی در غده تیروئید می‌شود. ایزوتوپ‌سیانات‌های حاصل از هیدرولیز گلیکوزینولات‌های سبب تغییر نسبت T_3 و T_4 شده و سنتز تیروکسین را کاهد و نهایتاً بر مصرف خوارک و بازده طیور اثر منفی خواهد داشت. البته با توجه به نتایج تحقیق می‌توان بیان داشت که استفاده از این کنجاله تاسطح ۵ درصد هیچ‌گونه اثری بر بافت تیروئید نخواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: کنجاله کانولا، ریخت‌شناسی، جوجه گوشتی، تیروئید.

که مقدار فیبر آنهانیز بسیار کاهش یافته است. بدین ترتیب تداوم اصلاح کلزا در مسیر کاهش این مواد قرار گرفت و ترتیب تکامل اصلاح در این گیاه رونقی به قرار زیر بوده است:

ارقام صفر(۰): در این ارقام میزان اسیداروسیک به حد بسیار اندکی تقلیل یافته است.

ارقام دو صفر(۰۰): در این ارقام علاوه بر اسیداروسیک میزان گلوكوزينولات‌های نیز بسیار کاهش یافته است. ارقام سه صفر(۰۰۰): این ارقام هر ۳ ماده نامطلوب را در کمترین مقدار خود دارا می‌باشند، یعنی اسیداروسیک، گلوكوزينولات و فیبر به حداقل رسیده‌اند (۱).

گلوكوزينولات‌ها به عنوان مواد گواترزا، دسته‌ای از ترکیبات طبیعی هستند که در گیاهان به طور گستردگی وجود داشته و محدود به تعدادی از خانواده‌های دولپه‌ای می‌شوند (۵). تمام اعضای خانواده چلیپائیان نظری کلزا حاوی گلوكوزينولات هستند (۷).


کانولا نامی است که در کانادا برای واریته‌های حاوی گلوكوزينولات کم کلزا به کار می‌رود. بر اساس تعریف انجمن کانولا کانادا، واریته‌های کانولا حاوی کمتر از ۲ درصد اسیدهای چرب روغن آن را اسیداروسیک و کمتر از ۳۰ میکرومول گلوكوزينولات‌های آلکنیلی به ازاء هر گرم ماده خشک دانه بدون روغن باشد (۲).

از آنجایی که قیمت کنجاله کانولا در مقایسه با کنجاله سویا که بخش


مقدمه

کلزا با نامی علمی Brassica napus و از تیره شب بو یا چلیپائیان یک گونه آمفی دیپلوفید حاصل از تلاقی فرم‌هایی از گونه کلم با شلغم در طبیعت می‌باشد. گیاهی علفی با دوره رشد یکساله است که به دو تیپ بهاره و پاییزه تقسیم می‌شود. سه گونه کلزا، شلغم روغنی و خردل هندی در بازار جهانی با نام فرانسوی کلزا و نام انگلیسی Rapeseed شناخته می‌شوند. گیاهان جنس Brassica بر حسب میزان اسیداروسیک به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند (۱). دسته اول با علامت اختصاری Erucic Acid Rapeseed (EAR) مشخص می‌شوند که دارای مقادیر زیادی اسید اروسیک (High HEAR) بوده و مصرف خوارکی ندارند. در سال ۱۹۷۴ روغن‌هایی که کمتر از ۵ درصد اسید اروسیک داشتند تحت عنوان Low Erucic Acid Rapeseed (LEAR) نامگذاری شدند. بعد از محققان کانادایی نام کانولا را برای ارقام اصلاح شده کلزا انتخاب نمودند (۱). علاوه بر اسید اروسیک یک ماده مضر دیگر در کنجاله و علوفه کلزا وجود دارد که تحت عنوان گلوكوزينولات شناخته می‌شود. گلوكوزينولات‌ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که در برخی از گیاهان وجود داشته و باعث طعم تند و بوی گزنه اندام‌های آنها می‌شوند. در ارقام جدید کلزا مشکل گلوكوزينولات‌های نیز حل شده و میزان این ماده مضر بسیار کاهش یافته است. فیرنیزیکی از موادی است که باعث افت کیفیت کنجاله می‌گردد و در آخرین کارهای اصلاحی، ارقامی معرفی شده‌اند







تصویر ۲- افزایش داریست غده به پارانسیم غده (فولیکولهای تیروئیدی) در غده تیروئید غیرفعال H and E X 100.



تصویر ۱- افزایش پارانسیم غده (فولیکولهای تیروئیدی) نسبت به داریست غده در غده تیروئید فعال H and E X 100.



تصویر ۴- بافت پوششی سنتگفرشی ساده دیواره فولیکولهای تیروئیدی (F) در غده تیروئید غیرفعال H and E X 400.



تصویر ۳- بافت پوششی مکعبی ساده دیواره فولیکولهای تیروئیدی (F) در غده تیروئید فعال H and E X 400.

- ۱- جیره کنترل (۰درصد کنجاله کانولا)
- ۲- جیره حاوی ۵درصد کنجاله کانولا
- ۳- جیره حاوی ۱۰درصد کنجاله کانولا
- ۴- جیره حاوی ۱۵درصد کنجاله کانولا
- ۵- جیره حاوی ۲۰درصد کنجاله کانولا

هر تیمار شامل ۴ تکرار بود. جوجه‌ها پس از ورود به سالن بطور تصادفی به پنهان مربوطه انتقال یافته‌ند به این ترتیب که به هرین (هر تکرار ۱۵ قطعه) جوجه تعلق گرفت. دوره پرورش ۴۲ روزه بود. دریابان دوره از هر تکرار ۴ قطعه جوجه به صورتی که وزنی نزدیک به میانگین هر تکرار داشته باشند جدا شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه جوجه‌ها کشتار شده و تیروئید آنها تفکیک شد. آزمایشات بافت شناسی مطابق با روش زی (Z) و همکاران در سال ۲۰۱ انجام پذیرفت (۸). پس از نمونه‌گیری از بافت تیروئید، نمونه‌ها در فرمالدئید ۱۰درصد پایدار گردید و سپس قطعاتی از بافت‌های پایدار شده انتخاب و پس از برش دادن و گذراندن مراحل آماده سازی بافتی و تهیه بلوك‌های پارافینی، مقاطعی به قطر ۶ میکرون تهیه شده و با روش

پروتئینی جیره طیور را تشکیل می‌دهد مناسب ترمی باشد و از طرفی ارزش تغذیه‌ای بالایی دارد و از همه مهمنتر اینکه به هیچ وجه ارزبری نداشته و در داخل کشور تهیه می‌شود می‌تواند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا باشد؛ آزمایشات مختلفی در مورد اثرات این ماده خوراکی بر فراسنجه‌های تولیدی و عملکردی انجام گرفته است ولی در مورد اثر کنجاله کانولا بر بافت تیروئید مطالعه قابل توجهی انجام نگرفته است که انجام این تحقیق در راستای این نیاز انجام گرفته است.

مواد و روش کار

در این پژوهش جهت بررسی اثرات کنجاله کانولا بر بافت تیروئید جوجه‌های گوشتشی، ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتشی سویه راس پس از تعیین جنسیت به سالن محل پرورش انتقال یافته‌ند. قبل از ورود جوجه‌ها سالن گازدهی و ضد عفونی شده بود و شرایط دما و رطوبت مطابق با استانداردهای سویه راس تنظیم شده بود. در این تحقیق ۵ جیره غذایی به عنوان تیمار آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت که عبارت بودند از:



دوم (درصد کنجاله کانولا) نسبت به گروه شاهد بیشتر شده است که البته این اختلاف معنی دار نیست ولی اختلاف این دو تیمار یعنی تیمار یک و دو با سه تیمار دیگر در سطح ادرصد معنی دار است. استفاده از ۲۰ درصد کنجاله کانولا در حیره سبب شده است که تعداد سلول های اپیتلیال بافت تیروئیدی در این تیمار نسبت به تمام تیمارهای دیگر بالاتر باشد اگرچه اختلاف آن با تیمار چهارم (۱۵ درصد کنجاله کانولا) معنی دار نیست.

ارتفاع سلول های اپیتلیال - ارتفاع سلول های اپیتلیال همانند تعداد آن تحت تأثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا قرار گرفت. روند تغییرات نیز مشابه بوده این ترتیب که سلول های اپیتلیال بافت تیروئید جوچه های گروه شاهد کمترین ارتفاع را داشتند و با افزایش سطح تیمار مربوطه بر ارتفاع سلول های اپیتلیال افزوده شد بصورتی که این افزایش سبب ایجاد اختلاف معنی دار تیمار پنجم (۲۰ درصد کانولا) با تمام تیمارها جز تیمار ۴ و اختلاف معنی دار تیمار کنترل با تمام تیمارها جز تیمار ۲ شد ($p < 0.01$).

قطر فولیکول ها - روند تغییرات در مورد فراسنجه قطر فولیکول متفاوت با دو فراسنجه دیگر بود. افزایش کنجاله کانولا به حیره تا ۵ درصد بر قطر فولیکول هایی تاثیر بود اگرچه قطر فولیکول در تیمار ۲ (درصد کانولا) بیشتر از گروه کنترل بود ولی این اختلاف معنی دار نبود. با افزایش سطح کنجاله کانولا ی جیره به ۱۰ درصد، قطر فولیکول ها بطور معنی داری ($p < 0.01$) نسبت به گروه کنترل و تیمار دوم افزایش یافت. افزایش سطح کنجاله کانولا ی جیره از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد و ۲۰ درصد اختلاف معنی داری را در قطر فولیکول های این سه تیمار ایجاد نکرد.

بحث

در طیور غده تیروئید همانند پستانداران بصورت یک غده مستقل وجود دارد که توسط کپسولی از بافت همبند احاطه شده است. این غده بعنوان بخشی از سیستم اندوکرین در رشد و تکامل، متابولیسم و هموستانز نقش حیاتی دارد (۱).

تأثیر گواترزاوی کانولا بر افزایش معنی دار در روزن تیروئید ثابت شده است (۱). همچنین خاصیت گواترزاوی دانه کلزا در موش ها زدیری باز شناخته شده است (۳). گزارش های قابل توجهی نیز در مورد بزرگ شدن اندازه تیروئید، افزایش سطح هورمون محرك تیروئید، هیبوتیروئیدیسم و کاهش هورمون های تیروئیدی در خون طیوری که با کنجاله کلزا تغذیه شده اند ارائه شده است (۴) اما تحقیق قابل توجهی در مرور ریخت شناسی یا مورفولوژی بافت تیروئید جوجه های گوشتشی تغذیه شده با کانولا انجام نشده است. وجود گلوكوزینولات ها در حیره دام و طیور باعث کاهش سطح چرخه هورمون های تیروئید و تغییرات نسبت بین T3, T4 در خون می گردد. تنها زمانی می توانند توسط غده تیروئید سنتز شوند که مقدار کافی ید در حیره غذایی به کار رفته باشد. یون های ید برخلاف گرادیان غلظت خون جذب شده و پس از اکسید شدن در رادیکال تیروزین جای می گیرد (۹).

ایزوتوپویسینات ها (مواد حاصل از هیدرولیز گلیکوزینولاتها در دستگاه

جدول ۱- فراسنجه های مورد بررسی در تحقیق. حروف غیر مشابه نشانه وجود اختلاف معنی دار ($p < 0.01$) بین میانگین های مربوطه است

درصد کنجاله کانولا	ارتفاع سلول های اپیتلیال	قططفولیکولها	تعداد سلول های اپیتلیال
.	۱/۷۲ ^C	۵۴/۱۳ ^B	۶۰/۰۰ ^C
۵	۱/۸۸ ^C	۵۷/۴۰ ^B	۶۲/۳۴ ^C
۱۰	۲/۷۵ ^B	۷۳/۴۰ ^A	۹۰/۰۸ ^B
۱۵	۳/۱۸ ^{AB}	۷۶/۹۳ ^A	۹۷/۰۴ ^{AB}
۲۰	۳/۳۴ ^A	۷۷/۳۳ ^A	۱۰/۱۲ ^A

هماتوکسیلین و اوزین جهت آزمایش های هیستولوژیک رنگ آمیزی شدند. جهت مشاهده نمونه های بافتی و اندازه گیری قطر فولیکول ها، تعداد سلول های اپیتلیال و ارتفاع سلول های اپیتلیال از میکروسکوپ نوری زایس بادرشتمنامه ۱۰۰ تا ۴۰۰ استفاده شد.

داده های رکوربداری شده این آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری ANOVA تجزیه و تحلیل آماری شد.

جدول تجزیه واریانس داده ها بر اساس طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار بست آمد. میانگین تیمارهای آزمایشی نیز با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن با یکدیگر مقایسه شدند. مدل آماری که جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت به صورت زیر می باشد:

$$Y_{ij} = \mu + A_i + e_{ij}$$

اجزاء این مدل عبارتند از:

$$Y_{ij} = \text{مقدار هر مشاهده}$$

$$\mu = \text{میانگین جامعه}$$

$$A_i = \text{اثر سطح آزاد تیمار A (کنجاله کانولا)}$$

$$e_{ij} = \text{خطای مربوط به هر مشاهده}$$

نتایج

واحد ساختمنانی غده تیروئید فولیکول است. فولیکولها اجسام کروی در اندازه های مختلف هستند و توسط بافت پوششی ساده پوشیده می شوند. فضای داخل فولیکول توسط ماده کلوئید پرمی شود که به شکل فضاهای سفیدرنگی بین بافت پوششی و کلوئید و همچنین در داخل کلوئید مشاهده می شود که در فولیکول های فعال بیشتر دیده می شود. بافت پوششی دیواره فولیکول ها، قطر فولیکول ها و تعداد سلول های اپیتلیال در غده تیروئید فعال و غیر فعال متفاوت است. بررسی این فراسنجه ها به ما کمک می کند که تاثیرات یک ماده غذایی بخصوص رابر غده تیروئید بررسی نمائیم (تصاویر ۱ تا ۴).

تعداد سلول های اپیتلیال - در این آزمایش تعداد سلول های اپیتلیال و ارتفاع آنها و قطر فولیکول ها اندازه گیری شد. همانطور که در جدول ۱ مشاهده می شود با افزایش سطح کنجاله کانولا ی جیره بافت سلول های اپیتلیال بافت تیروئیدی هم افزایش یافته است. تعداد سلول های اپیتلیال در تیمار



خواهد گرفت و بازده طیور پایین خواهد آمد؛ همان طور که Leslie و همکاران در سال ۱۹۷۲ پیشنهاد کردند، با وجود اینکه سطوح گلوكوزینولات‌ها در کنجاله کانولا به طور عمده کاهش یافته‌ولی هنوز هم درصد بسیار کمی از آن در کنجاله وجود دارد که ممکن است علت کاهش مصرف خوارک در طیور باشد.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از همکاری اقای دکتر مرتضی مهری در رابطه با اثایزنتایج و اقای مهندس فردوس ابراهیم پور در رابطه با تهیه مقاطع بافتی تشکر و قدردانی می‌گردد.

References

- Aughey, E., Frye, F. L. (2001) Comparative veterinary histology. Manson Publishing. Glasgow, UK. pp. 116.
- Bao, C., Xu, F., Sun, Y., Shao, C., Liu, M. (1995) Histological changes in main viscera of broiler chicks fed on different rapeseed meals containing toxic substances. Jian. J. Agric. Sci. 11:34-40.
- Bell, J. M. (1993) Factors affecting the nutritional value of canola meal. Canad. J. Anim. Sci. 73: 679-697.
- Chiasson, R. B., Sharp, P. J. (1979) Effect of rapeseed meal and methimazole on level of plasma hormones in growing broiler cockerels. Poultry Sci. 58: 1575-1583
- Ciska, A. R., Kozlowska, H. (1998) Glucosinolates of cruciferous vegetables. Polish J. Food. Nut. Sci. 7: 5-22.
- Clandinin, D. R., Bayly, L., Caballero, A. (1966) Rapeseed meal studies 5: Effects of (+)-5-venyl 2.oxazolidinthione, a goitrogen in rapeseed meal on the rate of growth and thyroid function in chicks. Poultry Sci. 45: 833-838.
- Fenwick, G. R., Curtis, R. E. (1980) Glucosinolates and their breakdown products in cruciferous crops, food and feeding-stuffs. Food. Chime. 11: 249-271.
- Iji, P.A., Hughes, R.J., Choct, M., Tivey, D.R. (2001) Intestinal structure and function of broiler chickens

گوارش)، یدمehr شده در خون را به غده تیروئید منتقل می‌کنند (۲). Bao و همکاران در سال ۱۹۵۵ گزارش کرد که در غده تیروئید ایزوتوپیوسیانات با ید در تشکیل تیروکسین رقابت می‌کند و منجر به کاهش سنتز تیروکسین می‌شود. مشخص شده است که گواترین با مانع از اکسیداسیون ید منجر به کاهش دسترسی اندام‌های تولید کننده به حلقه‌های آروماتیک تیروزین (باندشدن) می‌شود. این حلقه‌ها اساس هسته ساختمان برای تشکیل تیروکسین می‌باشد. کاهش سنتز هورمون تیروئید با فیدبک منفی (با خورمنفی) هیپوفیز کنترل گردیده و افزایش تولید هورمونهای محرك تیروئید (TSH) منجر به شدت تولید هورمون TSH از هیپوفیز می‌شود. افزایش فعالیت فیزیولوژیکی ناشی از رقابت برای ید موجب تمایل به سمت افزایش اندازه (T4:T3) می‌شود (۱۲). طبق گزارش چیاسون و شارپ (۱۹۷۹) نشان داده شده که مصرف کنجاله کلزا در جیره جوجه‌های گوشته باعث کاهش جزیی سطح T4 در خون گردیده ولی در جوجه‌های گوشته سنین ۳ تا ۵ هفته‌گی کاهش قابل توجهی در سطح غلظت T3 مشاهده گردیده است و افزودن هورمون تیروکسین به جیره غذایی جوجه‌های گوشته حاوی کنجاله کلزا، هیچ تأثیر سودمندی در رشد آنها نشان نداده است (۴).

Ciska و Kozlowska در سال ۱۹۹۸ ریخت شناسی غده تیروئید جوجه اردک‌های گوشته شده با جیره حاوی کنجاله کلزا امورد بررسی قرار دادند و غلظت‌های پایین کنجاله (۵ تا ۱۰ درصد کنجاله کلزا) را تا سن کشتار در ۲ ماهگی مورد بررسی قرار دادند. غلظت‌های پایین کنجاله کلزا تأثیر کم یا هیچ تأثیری بر روی غده تیروئید نداشت، اما تغییرات پاتالوژیکی گوناگونی با سطوح بیشتر کنجاله کلزا مشاهده شد (۵).

در یک آزمایش تا ۲۰ درصد کنجاله کانولا به جوجه‌های گوشته داده و گزارش شده که هیچ تفاوت معنی داری در اضافه وزن و خوارک مصرفی درین گروه‌های مختلف تیماری وجود ندارد. اما وزن تیروئید با افزایش سطوح کنجاله کانولا در جیره افزایش یافت (۱۲). در مطالعه‌ای Clandinin و همکاران در سال ۱۹۶۶ تأثیر گویترين در سطح ۰/۱۵ درصد در جیره جوجه‌های گوشته را روی میزان رشد بررسی کردند و یک کاهش در عملکرد و بزرگ شدن تیروئید را مشاهده کردند (۶).

در یک تحقیق که کنجاله کانولا در سطوح مختلف جایگزین کنجاله سویا در جیره جوجه‌های گوشته شده بود وزن تیروئید در تیمارهای حاوی کنجاله کانولا در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بود (۱۳).

همه موارد یاد شده موجب تغییرات هیستولوژیک در بافت غده تیروئید می‌گردد. نتایج این تحقیق مؤید این مطلب است که در کانولای دو صفر اگرچه میزان گلیکوزینولات‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ ولی همین مقدار و همچنین ایزوتوپیوسیانات‌های حاصله باعث گواترینی و ایجاد تغییرات در بافت تیروئید جوجه‌های تغذیه شده با کانولای دو صفرمی شوند. لازم به ذکر است که همین مقدار کم ماده ضد تغذیه‌ای ممکن است باعث کاهش مصرف خوارک هم بشود که در این صورت رشد نیز تحت تاثیر قرار



- on wheat-based diets supplemented with a microbial enzyme. Asian. Aus. J. Anim. Sci. 14: 54-60.
9. Karunajeewa, H., Ijagbuji, E. G., Reece, R. L. (1990) Effective of dietary levels of rapeseed meal and poly ethylene glycol on the performance of male broiler chickens. British Poultry Sci.31: 545-555.
10. Khan, M., Sarwar, M., Mahmood, S., Rebaz, A. (1996) Effect of various levels of rapeseed meal on the performance of broiler chicks. Pakistan Vet. J. l. 16: 192-195.
11. Leslie, A. J., Hurnik, J. F., Summers, J. D. (1972) Feeding value of rapeseed meal for laying hens. Canadian J. Anim. Sci. 52: 563-566.
12. Lo, M. T., Hill, D. C. (1971) Evaluation of protein concentrates prepared from rapeseed meal. J. Sci. Food Agriculture. 22: 128-130.
13. Nassar, A. R., Arscott, G. H. (1986) Canola meal for broiler and the effects of a dietary supplement of iodinated casein on performance and thyroid status. Nut. Report. Inter. 34: 791-799.
14. SAS Institute. (1982) SAS User's Guide: Statistics. SAS Institute Inc., Cary, NC.



EFFECT OF VARIOUS LEVELS OF CANOLA MEAL ON MORPHOLOGY OF THYROID GLAND IN BROILER CHICKS

Adibmoradi, M.*

Department of Basic Sciences Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.

(Received 17 June 2006 , Accepted 11 June 2007)

Abstract:

The present study performed to examine canola meal on morphology of thyroid gland in broiler chicks. In this experiment 300 1-day-old unsexed Ross broiler chicks assigned into 5 groups. The chicks were fed by five level of canola meal (0, 5, 10, 15 and 20%). After 42 days feeding four chicks from each pen killed and their thyroid glands removed and immediately were immersed in formaldehyde, before fixation in Bouin's solution and paraffin embedding. Each sample was then sectioned at a thickness of 7 mm, stained with haematoxylin and eosin, and examined by light microscopy. Measurements of diameter of follicles, epithelial cell number and epithelial cell height in all groups were made at 100 to 400x magnification. Diameter of follicles, epithelial cell number and epithelial cell height in treatment groups (treatments 3,4,5) were significantly increased as compared with control group (treatment 1) ($p<0.01$). These results showed that although glucosinolates in canola or double-zero rapeseed is very low, but canola meal can be affected on morphology of thyroid gland in broiler

Key words: canola, morphology, broiler, thyroid.

*Corresponding author's email: adibmoradi@ut.ac.ir, Tel: 021-61117112, Fax: 021-66933222

