

# مطالعه نقش سگ ولگرد و رویاه قرمز در چرخه اکینوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل<sup>۱</sup> دکتر مرتضی حسینی<sup>۲</sup> دکتر غلامرضا معتمدی<sup>۳</sup>

The potential role of stray dog and red fox in Echinococcosis / Hydatidosis life cycle in Lorestan province, Western Iran

Dalimi, A.<sup>۱</sup> Hosseini, M.<sup>۲</sup> Motamed, Gh.<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup>Department of Parasitology, Medical Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran - Iran. <sup>۲</sup>Department of Veterinary, Research Centres of Lorestan Provinces Ministry of Jahad - Agriculture, Lorestan - Iran. <sup>۳</sup>Department of Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj - Iran.

**Objective:** To determine the potential role of stray dog and red fox in Echinococcosis/Hydatidosis life cycle in Lorestan province, Western Iran. Meanwhile the prevalence of hydatid cysts among sheep, goats and cattle as well as fertility rates of different types and forms of cysts isolated from infected animals and the viability of protoscolices were also determined.

**Design:** Observational cross sectional study.

**Animals:** 42 stray dogs (Mixed breed), 30 red foxes (*Vulpes vulpes*), 6879 sheep, 3752 goats and 1968 cattle in Lorestan province in Western Iran during three years (1997-2000).

**Procedure:** Stray dogs and red foxes collected from different parts of Lorestan. The animals were collected either died freshly across the road or shot in the study area. Following autopsy of the animal, the small intestine removed, slit open and the epithelium of the intestine scraped into a jar. To collect the worm from the intestine, the epithelial scrapings and the intestinal contents were passed through wire sieves. The contents of the sieves were washed with tap water and *Echinococcus* was collected. Recovered worms were fixed in alcohol and stained with carmine. Meanwhile, sheep, goats and cattle were examined for hydatid cyst infection at three slaughterhouses. Fertility rate of different types and forms of cysts isolated from infected animals and the viability of protoscolices were also determined using standard methods.

**Statistical analysis:** Measurement of prevalence of infection, mean and standard deviation as well as student "t" test for comparing of the means.

**Results:** Results indicated that, 30.29% of the dogs and 6.67% of the red foxes were infected with *Echinococcus granulosus*. 25.29% of the sheep, 11.08% of the goats and 55.94% of the cattle were also found to be infected with hydatid cyst. In sheep, 52.89% of the cysts were found in lungs, 28.29% in the liver and 18.73% in both liver and lungs. In goats, 61.54% of the cysts were found in lungs, 33.41% in liver and 50.50% in both liver and lungs. In cattle, 52.86% of the cysts were found in lungs, 33.41% in liver and 50.50% in both liver and lungs. The cysts isolated from liver and lungs of the sheep showed higher fertility rate than the cysts of liver and lungs of goats and cattle. In this regard, the fertility rates of cysts isolated from sheep, goats and cattle were 35.47%, 16.88% and 14.70% respectively. The viability rate of protoscolices of the fertile cysts isolated from the slaughtered animals were found mostly higher than 80%.

**Conclusion:** The infection rate of Echinococcosis / Hydatidosis in animal of Lorestan province especially in stray dogs is very high. Hence, it should be controlled by sophisticated methods.

*J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 57, 3: 81-86, 2002.

**Key words:** *Echinococcus granulosus*, Hydatidosis, Stray dog, Red fox, Slaughtered animals, Lorestan, Iran.

کمک سگهای گله انجام می شود رایج است. در ایران گرچه سگها نقش بسیار مهمی در انتقال آلودگی دارند ولی در برخی از مناطق کشور

هدف: تعیین نقش سگ ولگرد و رویاه قرمز در چرخه اکینوکوزیس گرانولوزوس در استان لرستان و تعیین وضعیت آلودگی دامهای ذبح شده در کشتارگاههای استان به کیست هیداتیک بوده است. علاوه بر این، میزان بازوری کیست های جدا شده از دامها و اندامهای مختلف آنها و همچنین میزان زنده بودن پروتواسکولکس کیست دامها و اندامهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

**طرح:** مطالعه مشاهده ای مقطعی.

**حيوانات:** ۴۲ قلاده سگ، ۳۰ قلاده رویاه قرمز، ۶۸۷۹ رأس گوسفند، ۳۷۵۲ رأس بز و ۱۹۶۸ رأس گاو از استان لرستان.

**روش:** شکار و کالبدگشایی سگها و رویاه ها، شستشو و بررسی روده کوچک آنها از لحاظ آلودگی به اکینوکوزیس، مراجعت به کشتارگاههای استان لرستان و بازرسی اندام دامهای کشتار شده به کیست هیداتیک و ثبت آنها، سنجش میزان بازوری کیست های هیداتیک دامهای مختلف و سنجش میزان زنده بودن پروتواسکولکس کیست های هیداتیک دامهای مختلف.

**تجزیه و تحلیل آماری:** اندازه گیری میزان گیری میانگین و انحراف معیار میزانها و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون "t".

**نتایج:** به طور کلی از مجموع ۴۲ قلاده سگ، ۳۰ قلاده رویاه قرمز، ۲ قلاده (۶/۶ درصد) به اکینوکوزیس گرانولوزوس آلود بوده اند. در کشتارگاههای خرم آباد، دلفان و سلسله استان لرستان، از مجموع ۶۸۷۹ رأس گوسفند تحت مطالعه ۲۵/۲۹ درصد، از مجموع ۳۷۵۲ رأس بز، ۱۱/۰۸ درصد و از مجموع ۱۹۶۸ رأس گاو ۵۵/۹۴ درصد به کیست هیداتیک آلوده بوده اند در گوسفندان آلوده، ۵۲/۸۷ درصد آلودگی در ریه ها، ۲۸/۳۹ درصد در کبد و ۱۸/۷۳ در درصد به صورت آلودگی توأم و در بزهای آلوده، ۶۱/۵۴ درصد آلودگی در ریه ها، ۳۳/۴۱ درصد در کبدها و ۵۰/۵۰ درصد به صورت آلودگی توأم و در گاوها آلوده، ۵۲/۸۶ درصد آلودگی در ریه ها و ۲۸/۴۳ در درصد در کبدها و ۱۸/۸۹ درصد به صورت آلودگی توأم بوده است. ۳۵/۴۷ درصد کیست های گوسفندان، ۱۶/۸۸ درصد کیست های بزها و ۱۴/۷۰ درصد کیست های گاوها دارای کیست های بارور بوده و میانگین درصد زنده بودن پروتواسکولکس ها در کیست های بارور ریه گوسفندان ۸۷/۵ درصد، کبد گوسفندان ۹۲/۳۵ درصد، ریه بزها ۷۸/۵ درصد، کبد بزها ۹۵/۷۵ درصد، ریه گاوها ۹۳ درصد و کبد گاوها ۸۴/۴۴ درصد بوده است.

**نتیجه گیری:** به طور کلی می توان نتیجه گرفت که آلودگی اکینوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان شیوع بالایی داشته و با توجه به اهمیت بهداشتی و اقتصادی این بیماری لازم است اقدامات مؤثری در کنترل این بیماری در استان صورت پذیرد. مجله دانشکده دامپروری دانشگاه تهران، (۱۳۸۱)، دوره ۵۷، شماره ۳، ۸۱-۸۶.

**واژه های کلیدی:** اکینوکوزیس گرانولوزوس، هیداتیدوزیس، سگ ولگرد، رویاه قرمز، دامهای ذبح شده، لرستان

اکینوکوزیس - هیداتیدوزیس از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات است که انتشار جهانی داشته و سالیانه خسارت های اقتصادی و بهداشتی فراوانی به جامعه وارد می سازد. در فرم مرتعی میزان اصلی انگل اکینوکوزیس گرانولوزوس سگ و میزان ایجاد این گوسفند، بز و گاو است. این چرخه در مناطقی که دامها را به صورت سنتی پرورش می دهند و گله داری به

(۱) گروه آموزشی انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

(۲) بخش تحقیقات دامپروری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان وزارت جهاد کشاورزی، لرستان - ایران.

(۳) مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج، کرج - ایران.



(۳) نحوه مطالعه کیست ها: از هر نوع دام تعدادی ریه و کبد آلوده به صورت تصادفی انتخاب و در همان روز کیست ها از لحاظ تعداد و اندازه مورد بررسی داده می شد. به علاوه باروری کیست ها و میزان زنده بودن پروتواسکولکس آنها نیز بررسی می شد. (الف) نحوه شمارش و اندازه گیری ابعاد کیست ها: ابتدا بافت اطراف کیست را به دقت تراشیده و از اندام آلوده جدا می گردید. سپس نسبت به شمارش تعداد کیست در هر اندام و اندازه گیری ابعاد آنها با کولیس اقدام می شد. به علاوه نوع کیست از لحاظ تک حفره ای و چند حفره ای نیز تعیین می گردید. (ب) نحوه تعیین میزان باروری کیست ها: ابتدا تعدادی کیست را به صورت تصادفی انتخاب و سطح خارجی آنها را با تنظیر تیز نموده سپس به کمک اسکالپر دیواره آنها برش داده و لایه زایی آنها خارج می گردید. پس از چندبار شستشوی محتویات کیست با سرم فیزیولوژی از لحاظ وجود پروتواسکولکس موربررسی قرار می گرفت. کیستهای بدون پروتواسکولکس و کیست های پنیری و یا آهکی شده به عنوان کیستهای غیر بارور در نظر گرفته می شد. (ج) نحوه تعیین میزان زنده بودن پروتواسکولکس ها: ابتدا مایع کیست بارور را در یک ظرف تمیز ریخته و خوب به هم زده می شد سپس با پیچیدن پاستور قطره کوچکی از مایع را برداشته روی لام قرار داده و رنگ ائوژین حیاتی  $0.1\%$  درصد به آن اضافه می گردد. پس از گذاشتن لام بلا فاصله رنگ پدیری پروتواسکولکس ها به کمک میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گرفت. برای تعیین میزان زنده بودن پروتواسکولکس ها معمولاً تعداد یکصد عدد پروتواسکولکس را شمارش کرده و درصد پروتواسکولکس های رنگ نگرفته (زنده) ثبت می شود.

## نتایج

آلودگی در گوشتخواران: به طور کلی از مجموع ۴۲ قلاده سگ، ۱۳ قلاده ( $30/95$  درصد) و از ۳۰ قلاده روباه قرمز، ۲ قلاده ( $6/67$  درصد) به اکینوکوکوس گرانولوزوس آلود بودند. در یک قلاده شغال و دو قلاده گرگ انگل اکینوکوکوس مشاهده نشد.

آلودگی در نشخوارکنندگان: (۱) آلودگی بر حسب نوع دام: در کشتارگاههای خرم آباد، دلفان و سلسه استان لرستان، از مجموع  $68/29$  رأس گوسفند تحت مطالعه  $25/29$  درصد. از مجموع  $37/52$  رأس بز،  $11/8$  درصد و از مجموع  $19/68$  رأس گاو  $55/94$  درصد به کیست هیداتیک آلود بودند (جدول ۱). (۲) آلودگی بر حسب اندام دام: در گوسفندان آلود  $52/87$  درصد آلودگی در ریه ها،  $28/39$  درصد در کبد و  $18/23$  درصد به صورت آلودگی تؤام و در بزهای آلود  $61/54$  درصد آلودگی در ریه ها.  $33/41$  درصد در کبد ها و  $50/50$  درصد به صورت آلودگی تؤام و در گاو های آلود  $52/86$ .  $52/86$  درصد آلودگی در ریه ها و  $28/43$  درصد در کبد ها و  $18/89$  آلود. درصد به صورت آلودگی تؤام بوده است (جدول ۱). اختلاف آلودگی در ریه و کبد گوسفند، بز و گاو از نظر آماری معنی دار بوده است ( $P < 0.05$ ). علاوه بر کبد و ریه، کیست های کلیوی در گوسفند و بز و گاو و کیست های قلبی در گوسفند و گاو مشاهده شد. (۳) درصد باروری کیست ها:  $35/47$  درصد کیست های گوسفندان،  $16/88$  درصد کیست های بزها و  $14/70$  درصد کیست های گاوها در این رابطه در گوسفندان (جدول ۲). در این رابطه در گوسفندان،  $24/34$  درصد کیست های ریوی و  $36/92$  درصد کیست های کبدی، در بزها  $15/79$  درصد کیست های ریوی و  $20$  درصد کیست های کبدی و در گاوها  $16/95$  درصد کیست های ریوی و  $11/63$  درصد کیست های کبدی بارور بودند (جدول ۳). (۴) درصد زنده بودن پروتواسکولکس در کیست های بارور:

گوشتخواران وحشی از قبیل شغال زرد و روباه قرمز نیز چرخه زندگی انگل را به شکل وحشی حفظ می نمایند. آلود بودن گوشتخواران وحشی معمولاً مانع از کنترل کامل آلودگی در منطقه می گردد به همین جهت لازم است که در همه مناطق کشور علاوه بر سگ، گوشتخواران وحشی از جمله گذشته در مناطق مختلف کشور بررسیهای متعددی در زمینه میزان آلودگی سگها و برخی گوشتخواران وحشی به اکینوکوکوس و آلودگی دامهای مختلف (گوسفند، بز و گاو) به کیست هیداتیک گزارش شده است (۱ الی ۱۷). استان لرستان، استانی با مساحتی بالغ بر  $28044$  کیلومتر مربع در غرب کشور است این استان از شمال به استان مرکزی و همدان، از جنوب به استان خوزستان، از غرب به کرمانشاه و ایلام و از شرق به استان اصفهان محدود است.  $25$  درصد این استان را اراضی تبه ای و کوهستانی تشکیل می دهد و گله داری یکی از مشاغل مهم و رایج مردم این استان بخصوص در مناطق روستایی و عشایری به شمار می آید. در این استان تاکنون مطالعه جامعی در مورد وضعیت اکینوکوکوزی - هیداتیدوزی صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه تعیین نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوس گرانولوزوس و تعیین وضعیت آلودگی دامهای ذبح شده در کشتارگاههای استان لرستان به کیست هیداتیک است. علاوه بر این، میزان باروری کیست های جدا شده از دامها و اندامهای مختلف آنها و همچنین میزان زنده بودن پروتواسکولکس کیست دامها و اندامهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.

## مواد و روش کار

این مطالعه از نوع مشاهده ای - توصیفی و مقطعي و سه مرحله اجرایی داشته است:

### جمع آوری نمونه

(۱) جمع آوری نمونه از گوشتخواران: پس از هماهنگی با بخش دامپزشکی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان و گرفتن مجوز لازم از سازمان حفاظت از محیط زیست، تعدادی از گوشتخواران وحشی از قبیل روباه قرمز ( $30$  قلاده)، شغال زرد ( $1$  قلاده) و گرگ ( $2$  قلاده) و همچنین  $42$  قلاده سگ ولگرد با اسلحه شکار گردید. پس از ثبت مشخصات ظاهری حیوانات، جسد آنها به آزمایشگاه انتقال داده می شد. در عملیات کالبدگشایی با رعایت کلیه اصول محافظتی، ابتدا روده باریک آنها را با ناخ بسته و پس از زنده روده از معده ابتدا و انتهای روده باریک آنها را با ناخ بسته و پس از زنده روده از معده و روده کلفت، به صورت یخ زده بسته بندی و نگهداری می شد. در آزمایشگاه با رعایت کلیه اصول محافظتی، ابتدا روده باریک را با فیچی در یک تشتک حاوی آب باز کرده سپس بافت پوششی روده با اسکالپر کامل تراشیده و به همراه محتویات روده جمع آوری می گردید. به این محتویات پس از عبور از الک  $40$  و  $100$  و شستشوی کامل، الكل  $80$  درجه اضافه و تازمان آزمایش در ظرف مناسب نگهداری می شد. برای جداسازی انگلها اکینوکوکوس از محتویات از استریومیکروسکوپ و برای تشخیص گونه انگل از شاخصهای مرفولوژیکی نمای میکروسکوپ نوری انگل استفاده شد.

(۲) جمع آوری نمونه های کیست هیداتیک: پس از هماهنگی با اداره دامپزشکی و بخش دامپزشکی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان با مراجعت به کشتارگاههای مختلف در طول یکسال ضمن ثبت مشخصات دامهای آلود به کیست هیداتیک، نمونه هایی از کیست جمع آوری و برای انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال گردید.



جدول ۱- فراوانی نسبی و مطلق آلودگی اندام دامهای کشتار شده در کشتارگاههای استان لرستان به کیست هیداتیک.

اندام آلوده کننده										دام آلوده	تعداد موارد تحت مطالعه	نوع دام	کشتارگاه
کلیه قلب	تعداد												
تعداد	درصد												
۱	۱	۱۸/۱۴	۲۶۷	۵۰/۳۴	۷۴۱	۳۱/۵	۴۶۴	۲۷	۱۴۷۲	۵۴۵۱	گوسفند	خرم آباد	
.	.	۴/۹۰	۲۰	۶۱/۵۳	۲۵۱	۳۳/۵۷	۱۳۷	۱۱/۵۲	۴۰۸	۳۵۳۳	بز		
۱	۴	۱۶/۷۲	۱۶۲	۵۲/۳۲	۵۰۷	۳۰/۹۵	۳۰۰	۶۱/۲۵	۹۶۹	۱۵۸۲	گاو		
.	.	۱۸/۵۹	۲۹	۶۹/۸۷	۱۰۹	۱۱/۵۳	۱۸	۱۶/۴۴	۱۵۶	۹۴۹	گوسفند		
.	۱	۱۴/۲۸	۱	۵۷/۱۴	۴	۲۸/۵۷	۲	۶۱/۰۳	۷	۱۱۶	بز	دلغان	
.	.	۳۸/۱۸	۴۲	۵۱/۸۱	۵۷	۹/۰۹	۱۱	۳۱/۸۸	۱۱۰	۳۴۵	گاو		
.	.	۲۶/۷۸	۳۰	۶۲/۵	۷۰	۱۰/۷۱	۱۲	۲۳/۲۸	۱۱۲	۴۷۹	گوسفند		
.	.	.	.	۱۰۰	۱	.	.	۰/۹۷	۱	۱۰۳	بز	سلسله	
.	.	۱۶/۶۷	۴	۷۵	۱۸	۸/۲۳	۲	۵۸/۰۳	۲۴	۴۱	گاو		
۱	۱	۱۸/۷۳	۲۲۶	۵۲/۸۷	۹۲۰	۲۸/۳۹	۴۹۴	۲۵/۲۹	۱۷۴۰	۶۸۷۹	گوسفند		
.	۱	۵۰/۰۵	۲۱	۶۱/۵۴	۲۵۶	۳۳/۴۱	۱۳۹	۱۱/۰۸	۴۱۶	۳۷۵۲	بز	کل استان	
۱	۴	۱۸/۸۹	۲۰۸	۵۲/۸۶	۵۸۲	۲۸/۴۳	۳۱۳	۵۵/۹۴	۱۱۰۱	۱۹۶۸	گاو		

جدول ۲- فراوانی نسبی و مطلق کیست های هیداتیک بارور و غیربارور یافت شده در دامهای کشتار شده در کشتارگاههای استان لرستان.

نوع دام	تعداد موارد تحت مطالعه	وضعیت باروری	کیست غیربارور	کیست بارور	تعداد درصد
گوسفند	۲۹۶	۸۷/۵	۹۲/۳۵	۱۹۱	۶۴/۵۳
بز	۷۷	۷۸/۵	۹۵/۷۵	۶۴	۸۳/۱۲
گاو	۲۰۴	۸۴/۴۴	۹۳	۱۷۴	۸۵/۳۰

درمی یابیم که میزان آلودگی سگهای ولگرد در این استان حد متوسط استانهای همچو ااست در واقع هرچه از جنوب به سمت شمال زاگرس پیش رویم میزان آلودگی بیشتر دیده می شود. و این به علت شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مناسب و رواج بیشتر گوسفندداری در مناطق شمالی زاگرس است.

در اکثر کشورهای خاورمیانه گرچه به علت اعتقادات اسلامی سگهای خانگی کمتر به محیط خانه راه داده می شوند ولی سگهای ولگرد و گله از عوامل اصلی انتشار هیداتیدوزیس به شمار می آیند. در این کشورها از جمله ایران، در مناطقی که مقربات کشتارگاهی به دقت رعایت شود میزان آلودگی سگها بسیار کم ولی در مناطق روستایی و فقری که معمولاً رعایت قوانین کشتارگاهی در آن جا کمتر است آلودگی شدید دیده می شود.

در این مطالعه ۶۴/۶۷ درصد رویاهای تحت مطالعه به اکینوکوکوس گرانولوزوس آلوده بوده اند در مورد آلودگی رویاه قرمز درجهان گزارشها بسیار محدود و کمی وجود دارد. در کشورهای خاورمیانه به جز ایران، هیچ گونه گزارشی در مورد آلودگی رویاه قرمز تاکنون ارایه نشده است. در ایران گزارشها محدود به مطالعات سپهر منش و دلیمی در سال ۱۳۷۶ در اراک و دلیمی و همکاران در سال ۱۳۷۹ در بوشهر است که به ترتیب درصد آلودگی رویاه قرمز را ۱۰۰ درصد و صفر درصد گزارش نموده اند (۲، ۹). با توجه به پایین بودن میزان و شدت آلودگی رویاه قرمز می توان گفت که این حیوان در لرستان نقش زیادی در انتقال اکینوکوکوس ایفا نماید.

در این بررسی ۲۵/۲۹ درصد گوسفندان تحت مطالعه به کیست هیداتیک آلوده بوده اند. میزان متوسط آلودگی گوسفندان در ایران حدود ۱۰ درصد و دامنه آن بین ۱ الی ۵۰ درصد گزارش شده است. بیشترین میزان گزارش شده مربوط به گوسفندان استان کردستان ۵۱/۹ درصد (۲) و پس از آن گوسفندان همدان ۲۷/۵ درصد (۱) و شیراز ۲۶/۶ درصد (۱۷) است در سایر مناطق کشور این میزان کمتر از ۲۰ درصد گزارش شده است. در گوسفندان آلودگی کیست هیداتیک علاوه بر ریه و کبد در کلیه و قلب نیز

میانگین درصد زنده بودن پروتواسکولکس هادر کیست های بارور ریه گوسفندان ۸۷/۵ درصد، کبد گوسفندان ۹۲/۳۵ درصد. ریه بزها ۷۸/۵ درصد، کبد بزها ۹۵/۷۵ درصد، ریه گاوهای ۹۳ درصد و کبد گاوهای ۸۴/۴۴ درصد بوده است (جدول ۴).

### بحث

به طور کلی ۳۰/۹۵ درصد سگهای ولگرد و ۶۷/۶۷ درصد رویاهای قرمز تحت مطالعه به اکینوکوکوس آلوده اند. در بررسی آلودگی سگهای ایران از سال ۱۳۳۴ تاکنون میزان آلودگی سگها در استانهای مختلف کشور بین ۳ الی ۵۰/۵ درصد و به طور متوسط ۲۲/۴۵ درصد گزارش شده است. در استانهای همچو ایلام میزان آلودگی سگهای ولگرد در اصفهان ۵۰/۵ درصد (۱۶)، سگهای گله اردستان اصفهان ۳۱/۴ درصد (۳)، در استان مرکزی میزان آلودگی سگهای ولگرد اراک ۱۶/۶ درصد و سگهای گله ۳۱/۲۵ درصد (۹)، در استان همدان میزان آلودگی سگهای ولگرد همدان ۴۸/۳ درصد (۱۲)، در استان کرمانشاه میزان آلودگی سگهای ولگرد اهواز ۲۰ درصد (۸)، در استان ایلام میزان آلودگی سگهای ولگرد ۷/۲ درصد (۴) گزارش شده است.

با مقایسه میزان آلودگی سگهای استان لرستان با استانهای همچو



جدول ۳- فراوانی نسی و مطلق کیست‌های بارور و غیربارور یافته شده در اندام دامهای کشتار شده در کشتارگاههای استان لرستان

نوع دام	اندام آلوده	تعداد موارد تحت مطالعه	بیوتواسکولکس	وضعیت باروری		کیست بارور	آهکی	چوکی	تعداد درصد	تعداد درصد	تعداد درصد
				کیست بارور	کیست غیربارور						
گوسفند	ریه	۱۶۶	۲۵	۳۴	۵۰	۵۷	۳۰/۱۲	۲۰/۴۸	۳۴	۱۵۱/۶	۵۷/۳۴
بز	کبد	۱۳۰	۱۵	۳۱	۲۶	۴۸	۲۷/۶۹	۲۳/۸۵	۳۱	۱۱۵۴	۳۶/۹۲
گاو	ریه	۱۱۸	۶۸	۲۱	۹	۲۰	۷/۶۳	۱۷/۸۰	۲۱	۵۷/۶۳	۱۶/۹۵
بز	کبد	۸۶	۵۱	۲۲	۲	۱۰	۳/۹۲	۲۶/۷۴	۲۲	۵۹/۳۰	۱۱/۶۳
گاو	ریه	۵۷	۱۲	۱۹	۱۷	۹	۲۹/۸۲	۲۳/۳۳	۱۹	۲۱/۰۵	۱۵/۷۹
بز	کبد	۲۰	۲	۱۱	۳	۱۵	۴	۱۵	۱۱	۱۰	۲۰

متوسط میزان آلوده‌گی گاوهای در ایران حدود ۱۲ درصد و دامنه آن بین ۱ الی ۲۸ درصد گزارش شده است. بیشترین میزان گزارش شده مربوط به استان کردستان به میزان ۲۸/۲ درصد (۲) بوده است در اکثر مناطق کشور آلوده‌گی گاوهای کمتر از ۲۰ درصد گزارش شده است ولی آلوده‌گی در گاوهای این استان بسیار شدید بیش از دو برابر متوسط آلوده‌گی در کشور است. در گاوهای علاوه بر کبد و ریه آلوده‌گی هیداتیک در کلیه و قلب نیز مشاهده شد. بیشترین موارد در ریه و نسبت آلوده‌گی ریه ۱/۸۶ برابر کبد بوده است. میزان آلوده‌گی ریه، کبد و آلوده‌گی توان کبد و ریه در مطالعه حمیدیه و دلیمی در سال ۱۳۷۹ در گاوهای زنجان به ترتیب ۸۰/۷ و ۵/۲۶ درصد. درصد ۱۴۰/۴ در گزارش شده است.

میزان بارور بودن کیست‌ها فاکتور مهمی در ثبات چرخه زندگی اکنیوکوس به شمار می‌آید. این میزان بر حسب نوع و اندام دام، محل جغرافیایی، نوع و اندازه کیست متفاوت است. بالا بودن این میزان نشان دهنده فعال بودن شدید چرخه است. به طور کلی میزان باروری کیست‌های مطالعه شده در دامهای استان لرستان نسبت به استانهای دیگر کمتر است. از طرفی، بیشترین میزان باروری در کیست‌های گوسفندی و پس از آن به ترتیب در کیست‌های بزی و گاوی مشاهده شد. در مطالعه شاکریان و همکاران در سال ۱۳۷۹ ۸۵/۲ درصد کیست‌های گوسفندی ۷/۶۸ درصد کیست‌های بزی شهرکرد (۱۰) و در مطالعه حمیدیه و دلیمی در سال ۱۳۷۹ در ۴۹/۱۵ درصد کیست‌های گوسفندان و ۳/۵ درصد کیست‌های گاوی زنجان بارور بوده اند (۵). شاید علت پایین بودن این میزان مربوط به نحوه محاسبه کیست‌های بارور باشد. در مطالعه حاضر، کیست‌های پنیری و آهکی شده به عنوان کیست‌های غیربارور در نظر گرفته شده اند تا نقش آنها در چرخه زندگی انگل سنجیده شود. در حالی که در برخی از مطالعات، صرف‌کیست‌های عاری از پروتواسکولکس هارا به عنوان کیست‌های غیربارور در نظر می‌گیرند.

میزان زنده بودن پروتواسکولکس‌ها شاخص دیگری برای سنجش میزان خطر کیست‌های بارور می‌آید. بالا بودن این میزان نشان دهنده خطر بالقوه کیست در انتشار آلوده‌گی است. در دامهای استان لرستان همانند سایر مناطق کشور میزان زنده بودن پروتواسکولکس کیست‌های بارور بسیار بالا

جدول ۴- دامنه و متسط درصد زنده بودن پروتواسکولکس‌های هیداتیک یافته شده در دامهای کشتار شده در کشتارگاههای استان لرستان بر حسب اندام آلوده

نوع دام	اندام آلوده	درصد زنده بودن انحراف معیار ± میانگین	دانمه
گوسفند	ریه	۳۰ - ۱۰۰	۸۷/۵۰ ± ۱۷/۰۱
گاو	کبد	۲۰ - ۱۰۰	۹۲/۲۵ ± ۱۵/۰۶
بز	ریه	۵۰ - ۱۰۰	۹۳/۰ ± ۱۴/۹۰
گاو	کبد	۶۰ - ۱۰۰	۸۴/۴۴ ± ۱۴/۴۵
بز	ریه	۲۰ - ۱۰۰	۷۸/۸۵ ± ۲۸/۲۱
بز	کبد	۹۰ - ۱۰۰	۹۵/۷۵ ± ۴/۲۵

شاهد است. بیشترین موارد آلوده‌گی گوسفندان در ریه بوده است در واقع برزگی ریه به مراتب بیشتر از کبد و حدود ۱/۸۶ برابر کبد است. میزان آلوده‌گی ریه، کبد و توام کبد و ریه در مطالعه اربابی و همکاران در سال ۱۳۷۷ در گوسفندان همدان به ترتیب ۲۵/۶ درصد، ۴۰/۷ درصد و ۳۳/۷ (۱) درصد. در مطالعه شاکریان و همکاران در سال ۱۳۷۹ در گوسفندان شهرکرد به ترتیب ۳۷/۵ درصد، ۳۲/۸ درصد و ۱۲/۹۸ درصد (۱۰). در مطالعه فخار و مسعود در سال ۱۳۷۹ در گوسفندان قم به ترتیب ۲۲/۵ درصد در ۵۱/۱ درصد و ۴۷/۵ درصد در ۱۳۷۹ در مطالعه حمیدیه - دلیمی در سال ۱۳۷۹ در گوسفندان زنجان به ترتیب ۴۷/۵ درصد، ۱۷ درصد و ۳۵/۵ درصد (۵) گزارش شده است.

در ۱۱/۸ درصد بزهای تحت مطالعه آلوده‌گی کیست هیداتیک مشاهده شد. متسط میزان آلوده‌گی بزها در ایران حدود ۶/۴ درصد و دامنه آن بین ۵/۰ درصد الی ۲۰ درصد گزارش شده است بیشترین میزان گزارش شده مربوط به بزهای شیراز به میزان ۲۰/۶۱ درصد (۱۷) و پس از آن بزهای همکاران در سال ۱۳۷۱ در ۱۶/۱ درصد (۱) و بزهای شهریار به میزان ۱۱/۰۹ درصد (۱۳) بوده است. در بزها علاوه بر ریه و کبد، کیست کلیوی نیز مشاهده شد. بیشترین موارد آلوده‌گی در ریه و نسبت آلوده‌گی ریه ۱/۸۴ برابر کبد بوده است. میزان آلوده‌گی ریه، کبد و توام کبد و ریه در مطالعه اربابی و همکاران در سال ۱۳۷۷ در بزهای همدان به ترتیب ۳۵/۲۹ درصد، ۵۰/۹۸ و ۱۳/۷۲ درصد گزارش شده است (۱).

در گاوهای تحت مطالعه، آلوده‌گی به میزان ۵۵/۹۴ درصد مشاهده شد



## References

۱. اربابی، م. مسعود، ج. دلیمی اصل، ع. ح. و سجادی، س. م. (۱۳۷۷): بررسی شیوع کیست هیداتیک در دامهای ذبح شده در کشتارگاه همدان - مجله دانشور (۲۰)، صفحه: ۵۷-۲۶.
۲. حسینی، س. ا. و مسعود، ج. (۱۳۷۹): بررسی اپی دمبلولوزیک هیداتیدوزیس و اکینوکوکوزیس در منطقه دیواندره کردستان کتاب خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری انگل پزشکی ایران، تهران، صفحه: ۴۲۴.
۳. حسینی، س. ح. و حبیبی، م. (۱۳۷۶): بررسی آلدگیهای کرمی سگهای گله در شهرستان اردستان. کتاب خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری بیماریهای انگلی ایران، تهران، صفحه: ۱۹۳.
۴. حقوقی راد، ن. خرمیان فرد، م. ر. مصلی نژاد، ب. آویزه، ر. و تازیکی، غ. (۱۳۷۶): بررسی وفود اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگهای ولگرد و کیست هیداتیک در گوسفندان، گاوان و گاومیشهای منطقه اهواز، خوزستان، کتاب خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری بیماریهای انگلی ایران، تهران، صفحه: ۸۲.
۵. حمیدیه، ه. و دلیمی اصل، ع. ح. (۱۳۷۹): خصوصیات و میزان باروری کیست های هیداتیک دامهای ذبح شده در کشتارگاه زنجان در سال ۱۳۷۷. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. ۷ (۱۶)، صفحه: ۱۰-۱۴.
۶. خسروی، انصاری فر، ر. و مسعود، ج. (۱۳۷۶): بررسی وضعیت هیداتیدوز بز در استان ایلام - زمان ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶. کتاب خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری بیماریهای انگلی ایران، تهران، صفحه: ۱۵۴.
۷. دلیمی اصل، ع. ح. ظریف فرد، م. ر. و پورابراهیم، م. ر. (۱۳۸۰): مطالعه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس دامی در استان بوشهر، مجله پژوهش و سازندگی، ۵۰، صفحه: ۷۶-۷۸.
۸. دلیمی اصل، ع. ح. ظریف فرد، م. ر. معتمدی، غ. ر. و حق نظری، ج. (۱۳۸۰): مطالعه هیداتیدوزیس در دامهای کشور، فاز اول: مطالعه وضعیت آلدگی گوشتخواران وحشی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در غرب کشور، گزارش نهایی طرح ملی مصوب شورای پژوهش‌های علمی کشور شماره ۸۱۷.
۹. سپهر منش، م. ح. دلیمی اصل، ع. ح. قائم مقامی، ش. نیرومند، ح. و آفارضی، ح. (۱۳۷۹): بررسی فراوانی و پراکنش اکینوکوکوزیس در نشخوارکنندگان و سگسانان اهلی و وحشی در شهرستان اراک. کتاب خلاصه مقالات چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان، تهران، صفحه: ۲۵۱.
۱۰. شاکریان، ا. عالمیان، س. و شریف زاده، ع. (۱۳۷۹): بررسی میزان آلدگی گوسفندان لری - بختیاری و بزهای بومی و کیست هیداتید و یقین میزان باروری آنهادر کشتارگاه شهر کرد - کتاب خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری انگل شناسی پزشکی ایران، تهران، صفحه: ۲۴۳.
۱۱. فخار، م. و مسعود، ج. (۱۳۷۹): بررسی شیوع کیست هیداتید در کشتارگاه صنعتی استان قم سال ۱۳۷۹. کتاب خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری انگل شناسی پزشکی ایران، تهران، صفحه: ۲۳۸.
۱۲. فلاح، م. طاهرخانی، ح. و سجادی، س. م. (۱۳۷۶): مطالعه انگل‌های روده ای سگهای ولگرد شهر همدان و اهمیت بهداشتی آن در جامعه. کتاب خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران، تهران، صفحه: ۲۵۲.

می باشد لذا خطر انتقال آلدگی کیستها بسیار شدید است. در مطالعه حمیدیه و دلیمی در سال ۱۳۷۹ و حسینی و حبیبی در سال ۱۳۷۹ این میزان در کیستهای بارور گوسفندی به ترتیب ۶۷ درصد و ۸۱ درصد گزارش شده است (۳، ۵).

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که آلدگی اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان شیوع بالایی داشته و با توجه به اهمیت بهداشتی و اقتصادی این بیماری لازم است اقدامات موثری در کنترل این بیماری در استان صورت پذیرد. یکی از موثرترین این اقدامات معدوم سازی سگهای ولگرد، خواراندن داروهای آلدود به کیست در کشتارگاههاست. با انجام این اقدامات طبق یک برنامه جامع و صحیح می توان امیدوار بود که میزان آلدگی در گوشتخواران و به تبع آن در انسان به میزان قبل توجهی کاهش یابد.

## تشکر و قدردانی

این مطالعه بخشی از طرح ملی مصوب با شماره ثبت ۸۱۷ دبیرخانه شورای پژوهش‌های علمی کشور است. کلیه هزینه های مربوط به طرح توسعه شورای پژوهش‌های علمی کشور تأمین و با همکاری بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان راستان وزارت جهاد کشاورزی و بخش انگل شناسی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اجرا شده است. لذا لازم می دانیم از کلیه دست اندکاران و مسئولین محترم شورا، کمیته تخصصی دامپزشکی، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات استان راستان و مؤسسه رازی کمال تشکر و قدردانی را داریم همچنین از زحمات آقای جواد حق نظری از همکاران سابق مؤسسه تشکر می شود.



۱۳. وطن خواه، ع. و آسمار، م. (۱۳۷۹): بررسی میزان فراوانی کیست های هیداتیک استریل و بارور در کبد و ریه دامهای کشتارگاهی در کشتارگاه قائم شهریار در سال ۱۳۷۷. کتاب خلاصه مقالات چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان. تهران. صفحه: ۲۲۴.
14. Dalimi, A. and Mobedi, I. (1992): Helminth parasites of carnivores in northern Iran. Ann. Trop. Med. Parasitol., 86: 395-397.
15. Hoghoughi, N. and Jalayer, T. (1967): The prevalence of *Echinococcus granulosus* in dog in Shiraz, Iran. Ann. Trop. Med. Parasitol., 61: 437-438.
16. Hoghoughi, N. (1971): A study on the prevalence of *Echinococcus granulosus* in dog and hydatid cyst in sheep, goats, cattle and man in Isfahan. Pahlavi Med. J., 2: 670-672.
17. Oryan, A., N. Moghaddar, and Gaur, S.N. (1994): Metacestodes of sheep with special reference to their epidemiological status, pathogenesis and economic implications in Fars province, Iran. Parasitol. 51, 231-240.

