

مطالعه ایمونوھیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ

دکتر فرهنگ ساسانی^{۱*} دکتر عیسی جهانزاد^۲ دکتر بنفشه غلامحسینی^۳

دریافت مقاله: ۱۴۸۱ دی ماه
پذیرش نهایی: ۱۴۸۲ تیر ماه

Immunohistochemical study of sex hormonal receptors in canine mammary gland tumors

Sasani, F.¹, Jahanzad, I.², Gholamhosseini, B.³

¹Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran. ²Department of Pathobiology, Faculty of Medicine, University of Tehran Medical Sciences, Tehran-Iran. ³Center of Science and Research, University of Azad Islamic, Tehran-Iran.

Objective: In this research, immunohistochemical method was used to study estrogen and progesterone receptors in canine mammary gland tumors.

Animals: Six dogs with mammary gland tumors.

Procedure: six out of 141 paraffin embedded blocks of canine mammary gland tumors, were selected from files of veterinary pathology department, faculty of veterinary medicine, Tehran university. Tissue samples were processed then H&E and immunohistochemistry staining carried out on sections. **Results:** Neither of species showed positive reaction to oestrogenic receptor nor progestrone receptor.

Conclusion: Reasons for negative reactions may be one of these situations: malignancy of tumors, destruction of antigens in processing of tissues. It is necessary to remind that human being tumor markers have been used on uterus of horse with positive reaction to these hormones. Carcinoma is often observed with mixed tumors. Because of malignancy of carcinomatous tissues, there were no positive reactions. In this study ID5 monoclonal Ab for oestrogenic receptor and 1A6 colon for progestronic receptor have been used. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 58, 3: 283-285, 2003.

Key words: Tumor, Mammary gland, Dog, Immunohistochemistry, Sex hormonal receptor.

Corresponding author email: fsasani@yahoo.com

می گردد. برداشت آنها بعد از ۲/۵ سالگی هیچ اثر محافظت کننده ای ندارد. این اثر همزمان در انسان نیز اگر در ۲۶ سالگی یافته شود، وجود دارد (۱۰). این عمل باعث افت موقت رشد تومور پستانی می شود و برخی اثر برداشت تخدمان را روی تغییرات هیپرپلاستیک اطراف نشوپلاسم مؤثر دانسته اند. میزان استروژن ادراری در سگ ماده با نشوپلاسم پستانی افزایش می یابد. بزرگ شدن غده پستانی را در سگ ماده ای که ترکیبات استروژنی تزریقی را دریافت می نموده، مشاهده کرده اند. بعضی گیرنده استروژن را در ۵۲ درصد از کارسینوماهای پستان سگ کمتر از میزانی که در تومور پستانی انسان وجود دارد، یافته اند. محققان گزارشات بسیاری مبنی بر اینکه تومور پستانی در رابطه با اختلالات اندوکرینی می باشد، ارایه کرده اند (۴.۱۳). در تومور پستانی عوامل متعددی مثل سن بروز، ظاهر مورفولوژیک، متاستاز مکرر و حضور گیرنده استروژن روی سلول توموئی در سگ و انسان مشابه است و با شباهتیهای بیان شده در تومور پستانی سگ و انسان می توان از آن جهت مدلی برای مطالعات مکانیسم پرولیفراسیون و گیرنده های هورمونی سلطانی ای پستان انسان در پیشگیری و کنترل توموراهای پستانی انسان استفاده نمود. هدف کلی این پژوهه امکان کاربرد مارکرهای تومور پستانی

هدف: هدف از این پژوهش استفاده از تکنیک ایمونوھیستوشیمی و چگونگی کاربرد آن در توموراهای پستانی سگ و مطالعه گیرنده های استروژن و پروژسترون می باشد.

حیوانات: شش قلاده سگ مبتلا به تومور پستانی. روش: به طور اتفاقی ۶ بلوك پارافینه تومور پستانی سگ از بين ۱۴۱ تومور پستانی موجود در پرونده های آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران جهت آنجام رنگ آمیزی ایمونوھیستوشیمی H&E انجام گردید.

نتایج: هیچ یک از نمونه ها واکنش مثبت به گیرنده استروژن و پروژسترون نشان ندادند.

نتیجه گیری: ممکن است نتیجه فوق به دلیل عدم حضور گیرنده به خاطر بد خیمی تومور، عدم حفظ آنتی ژن در موقعیت اصلی در حین بروسه تهیه بافت باشد. البته لازم به ذکر است که مارکر تومور انسانی روی رحم اسب پاسخ مثبت نشان داد. کارسینوما در کنار تومور مختلط وجود داشته و مقاطع کارسینومایی به علت بد خیمی پاسخ مثبت نشان نداده اند. در این مطالعه از مونوکلونال آنتی بادی 1D5 برای گیرنده استروژن و از کلون 1A6 برای گیرنده پروژسترون استفاده شده است.

مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۴۸۲، دوره ۵۸ شماره ۳-۲۸۵، ۲۸۳-۲۸۵.

واژه های کلیدی: تومور، پستان، سگ، ایمونوھیستوشیمی، گیرنده هورمون جنسی.

ایمونوھیستوشیمی در تمام زمینه های بیولوژی مدرن و پژوهشی اهمیت ویژه ای دارد و با به کار گیری آنتی بادی ها برای شناسایی آنتی زنها بایجاد کنتراست ویژه در اجزای بافتی در تشخیص و تحقیق به کار می رود. برای تعیین حضور گیرنده های هورمونی در سلول تومور پستانی از روش ایمونوھیستوشیمی می توان کمک گرفت و با مشاهده آنها در پیش آگهی، تشخیص، پیشگیری، میزان پاسخ به درمان و طبقه بندی تومورها با منشأ تأعلوم می توان اظهار نظر نمود (۱۲). ضمناً این تکنیک امکان بررسی گذشته نگر روی بلوکهای توموری که با پارافین قالب گیری شده اند را فراهم می سازد. تومور پستانی بعد از تومور پوستی شایعترین نشوپلاسم در سگ می باشد و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تومور سگ ماده را تشکیل می دهد که از این بین ۶۵ درصد تومور مختلط خوش خیم و ۲۵ درصد کارسینوما می باشد. بقیه موارد هیپرپلازی، آدنوما، تومور مختلط بد خیم و میو ای تلیوما می باشد (۵.۱۰-۳۱). سن تقریبی سگهای دارای تومور پستانی ۶-۷ سال می باشد. گیرنده های هورمونی در تومور پستانی مهم می باشند. گیرنده استروژن و پروژسترون در سلولهای تومور پستانی سگ شناسایی شده اند (۴). منحنی توزیع سنی گیرنده های هورمونی در تومور پستانی منحنی زنگوله ای می باشد. تومور پستانی در سگهای مسن نسبت به سگهای ماده جوان بیشتر است. بروز تومور پستانی در سگها مشابه بروز کارسینومایی پستان در انسان می باشد (۲۰-۳۳). برداشت تخدمان و رحم در سگها قبل از اولین فحلی و رشد غدد پستانی، طبیعتاً خطر پیش روی نشوپلاسم پستانی را کاهش می دهد، ولی برداشت تخدمان بین اولین و چهارمین چرخه فحلی باعث افزایش تدریجی خطر پیش روی تومور

(۱) گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - ایران.

(۳) مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - ایران.

* نویسنده مسئول fsasani@yahoo.com



در مقاطع رنگ آمیزی شده با تکنیک ایمونوھیستوشیمی، سلولهای سرطانی در داخل الوتلها و مجاری وجود داشت که با سیتوپلاسم واکوئله و روشن و با هسته‌های دارای کروماتین در حال تقسیم مشاهده گردیدند. واکنش مثبت که شامل رنگ شدن هسته‌ها به رنگ قهوه‌ای متمایل به سبز می‌باشد، مشاهده نشد. در بخش‌های کوچکی واکنش کاذب با رنگ شدن سیتوپلاسم سلول دیده شد. یک نمونه از مقاطع بافت اندومنتر مربوط به رحم یک رأس اسب که با گیرنده استروژن انسانی واکنش مثبت داشت، برای مقایسه قرار داده شد که در آن مقاطع هسته‌های سلولهای اندومنتر همه رنگ گرفتند.

بحث و نتیجه گیری

مطالعات ایمونوھیستوشیمی در دستگاه تناسلی از جمله رحم و تخدمانها و پروستات در بسیاری از حیوانات از جمله موشهای که به عنوان مدل تحقیقاتی می‌باشند انجام گرفته است و در مراحل مختلف سیکل فحلی توزیع گیرنده‌های هورمونی در دستگاه تناسلی ارزیابی شده است ولی در مورد تومور پستانی بررسی و مطالعه چگونگی توزیع گیرنده‌های هورمونی سابقه زیادی ندارد. حضور استروژن نقش مهمی در فیزیولوژی پستان دارد و گیرنده استروژنی در پیشرفت طبیعی غدد پستان انسان و سگ مهم می‌باشد و استروژن اثر پرولیفراتیو روی بافت پستان دارد و هورمونهای استروئیدی در پیشروی تومورها در بافت پستان انسان و سگ شرکت دارند (۱۰). با یافتن سلولهای هدف برای استروژنها که موجب ظهور فاکتورهای رونویسی و ترجمه وابسته به هورمون شده کمک به تنظیم ظهور متنوع فاکتورهای رشد پارکرین و اتوکرین در لایه‌های سلولی تومور پستانی می‌شود، این هورمونها در پیشروی تومورها مؤثر می‌باشند. ظهور گیرنده‌های پروژسترون با آنتی بادی مونوکلونال هدایت شده علیه پروژتین انسانی در غدد پستانی سگ قابل شناسایی می‌باشد. واکنش ایمنی در بافت طبیعی و در تومور خوش خیم و بدخیم شناسایی می‌شود و نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روش‌های بیوشیمی توافق دارد و روش ایمونوھیستوشیمی برای مطالعه گیرنده پروژسترون در تومور پستانی سگ به اندازه روش‌های دیگر می‌تواند مؤثر باشد. رابطه ای معکوس بین ظهور گیرنده استروئیدی و میزان پرولیفراسیون سلولی نیز مشاهده گردیده است و با توجه به رابطه معکوس بین شرایط هورمونی و ظهور چندین فاکتور رشد و گیرنده‌های آنها مثل ظهور بیش از حد-2 cc-erb-2 که در سرطانهای پستان انسانی تشریح شده‌اند، شواهدی مبنی بر حمایت این فرضیه می‌باشد که پیشروی به سوی بدخیمی در تومور پستانی همراه با کاهش وابستگی هورمونی و افزایش رشد خود به خودی می‌باشد (۷،۸،۹،۱۰،۱۱).

در مطالعه ما از آنتی بادی مونوکلونال موجود برای ایمونوھیستوشیمی انسانی از کلون D51 برای گیرنده استروژن و از کلون A61 برای گیرنده پروژسترون استفاده شد (۱۰). با توجه به اینکه هیچ کدام از نمونه‌ها به گیرنده استروژن و پروژسترون واکنش مثبت نشان ندادند، ممکن است عدم حضور گیرنده هورمون استروئیدی به دلیل بدخیمی تومورها و یا عدم حفاظت آنتی زی در حین انجام مراحل پروسه کردن بافت‌ها چنین نتیجه‌ای را به وجود آورده باشد. امید است که با معرفی این تکنیک، امکانات به کارگیری آن در شناسایی و پیشگیری بیماریهای دامی در آینده‌ای نزدیک فراهم گردد.

در تومورهای حیوانی بوده است. هدف ویژه شناسایی گیرنده هورمونی پستانی سگ از جمله گیرنده‌های استروژن و پروژسترون بوده، با فرض بر اینکه با رشد و تکامل تومور به سوی بدخیمی از وابستگی هورمونی آنها کاسته می‌شود.

مواد و روش کار

با مطالعه پرونده‌های بخش آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تعداد ۱۴۱ تومور پستانی گزارش شده بود که همگی سگهای ماده از نژادهای خالص و مخلوط بودند. دامنه سنی آنها ۱۲-۴ سال بود: ۳۷ تومور پستانی فاقد پاسخ هیستوپاتولوژیک ثبت شده در پرونده‌ها وجود داشت. از بقیه تومورها ۳۵ مورد آدنوکارسینوما، ۳۲ مورد تومور مختلط پستانی، ۲۱ مورد لنفوسارکوما، ۷ مورد فیبر و سارکوما و بقیه موارد همانژیوپریسایتوما، فیبروپاپیلوما، همانژیو اندوتولیوما، آدنوما، فیبر آدنوما، ماستوسویتوما و کارسینومای سلول بازال بودند که با استفاده از تکنیک هماتوکسیلین ائوزین تشخیص هیستوپاتولوژیک داده شده بود. از بین بلوهای تومورهای پستانی، ۶ مورد به طور تصادفی انتخاب و برای مطالعه حضور گیرنده استروژن و پروژسترون در بخش ایمونوھیستوشیمی بیمارستان امام مورد آزمایش قرار گرفتند. در ضمن یک نمونه بافت از اندومنتر رحم یک رأس مادیان نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بعد از قالبگیری با پارافین، برش بافت به ضخامت ۳ میکرون تهیه گردید. مقاطع ۲۰ دقیقه در دمای ۶۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد در فور انکوبه شدند، ۲ تا ۳ بار در گزیلین (هر دفعه ۳ دقیقه)، ۲ بار انکوباسیون در اتائل ۱۰۰ درصد (هر دفعه ۳ دقیقه) انجام شد. رهیدراسیون با قرار دادن مقاطع در انانلهای ۹۰ درصد به مدت ۳ دقیقه در گردید. اگر پراکسید از داخلی مسئله ساز باشد، پراکسید از با انکوباسیون ۵ دقیقه در هیدروزن پراکسید ۳ درصد غیرفعال می‌گردد. اول با آب و بعد از آن ۳ بار در بافر حداقل به مدت ۵ دقیقه شستشو داده شدند. بافر تریس - اسید کلریدریک ۰/۲۵ مول با pH=۷/۴ می‌باشد. در برخی پرتوکلهای بافر فسفات می‌باشد.

اسلایدها با سرم ۵ درصد تهیه شده از گونه‌هایی که از آنها آنتی بادی ثانویه گرفته شده، برای بلوک کردن زمینه انکوبه شدند. هوای مرطوب را ایجاد می‌کند، برای بلوک کردن زمینه انکوبه شدند. اسلامیدها در اتاقک که هوای مرطوب دارد در تمام طول شب با آنتی بادی اولیه در یخچال قرار داده شدند. ۵۰-۵۰ میکرولیتر از آنتی بادی روی اسلامید قرار داده شد. اسلامید با یک جریان ملایم بافر شسته شد و حداقل ۵ دقیقه شستشو با بافر انجام شد. اسلامیدها با آنتی بادی ثانویه در اتاقک هوای مرطوب به مدت ۳۰ دقیقه مجدداً بافر با جریان ملایم شستشو داده شدند، در مرحله بعد با استرپتاویدین نشاندار (با پراکسیداز) به مدت ۳۰ دقیقه انکوبه گردیدند و پس از شستشو و قرار گرفتن در بافر (حداقل ۵ دقیقه) روی آن سوبسترا و کروموزن DAB+H₂O₂ در بافر فسفات (Riykthe) شد و پس از ۱۰ دقیقه شستشو شده و محلول کات کبود به مدت ۱ دقیقه روی آنها ریخته شد، آنگاه با هماتوکسیلین مایر رنگ گردیدند و ۱۵ دقیقه در آب روان قرارداده شده و نهایتاً با چسب و لامل پوشانده شدند.

نتایج

از ۶ نمونه تومور پستان بعد از رنگ آمیزی H&E و ایمونوھیستوشیمی ۵ نمونه تومور کارسینوما و یک نمونه تومور مختلط پستانی تشخیص و تأیید گردید.

