

اثرات بیهودی با زایلازین-کتامین بر روی درجه حرارت، تنفس، ضربان قلب، فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در گوسفند

دکتر علی بنی آدم^{۱*} دکتر فریدون صابری افشار^۱ دکتر یدالله احمدی فرد^۲

دریافت مقاله: ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۲

پذیرش نهایی: ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۲

The effect of xylazine-ketamine on temperature, heart and respiratory rate, arterial blood pressure and blood gases, in sheep

Baniadam, A.,¹ Saberi Afshar, F.,¹ Ahmadifard, Y.²

¹Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran. ²Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran.

Objective: The effect of xylazine-ketamine on cardiovascular system and respiratory system was evaluated by measurement of arterial blood pressure, blood gases, temperature, heart and respiratory rate.

Design: Self controlled study.

Animals: Five healthy sheep with an average weight of 21.4 kg were used in this study.

Procedure: Xylazine (0.2 mg/kg IM) was administrated 15 minutes prior to utilization of ketamine (10 mg/kg IV) in all animals. All baseline measurements (heart rate, respiratory rate and ...) were taken before the xylazine administration and were taken again at 5, 15, 30, 45 and 60 minutes intervals after induction of anesthesia with ketamine. Arterial catheters flushed with 2:1000 heparin solution were placed by using local anesthesia into the carotid artery via a 5 cm skin incision for measuring arterial blood pressure and collecting blood samples.

Statistical analysis: Repeated measure analysis of variances design and least significant difference were used to analyze data.

Results: On the basis of these results, heart rate did not change significantly. Mean arterial blood pressure decreased significantly at 30, 45, and 60 minutes after anesthesia. P_{aO_2} declined significantly at 60 minutes and P_{aCO_2} at first increased at 5 minute, then decreased at 15, 30, 45, and 60 minutes but remained significantly higher than before anesthesia, but respiratory rate did not change significantly. Temperature declined significantly at 5, 15, 30, 45 and 60 minutes after anesthesia.

Conclusion: According to this study, xylazine-ketamine combination has a little depressant effect on cardiovascular system. This combination is responsible for a little disturbed ventilation, decreased P_{aO_2} , increased P_{aCO_2} and declined body temperature in anesthesia. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 59, 3: 265-270, 2004.

Key words: Sheep, Xylazine, Ketamine, Blood gases, Blood pressure.

Corresponding author's email: abaniadam@yahoo.com

بیهودی در این دسته قبل از تزریق داروی بیهودی مصرف می شود. زایلازین در ابتدا به عنوان داروی ضد فشار خون ساخته شده ولی بعداً معلوم شد دارای اثرات تسکینی قوی در حیوانات است. زایلازین اولین بار به عنوان مسكن در گاو و نشخوارکنندگان در اروپا مصرف شد. همچنین متعاقب

هدف: در این مطالعه اثرات ترکیب زایلازین-کتامین بر روی دستگاه قلبی-عروقی و دستگاه تنفسی، با اندازه گیری فشار خون سرخرگی، گازهای خونی، دمای بدن، تعداد ضربان قلب و تنفس بررسی شده است.

طرح: بررسی مطالعه تجربی با استفاده از خود شاهدها. حیوانات: پنج رأس گوسفند سالم با میانگین وزن ۲۱/۴ کیلوگرم استفاده شده است.

روش: در کلیه گوسفندان زایلازین (۲/۰ میلی گرم بر کیلوگرم، عضلانی) ۱۵ دقیقه قبل از مصرف کتامین (۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم، وریدی) تزریق گردید. تمام مقادیر (ضریب قلب، تنفس و ...) قبل از تزریق زایلازین اندازه گیری شد و به ترتیب در زمانهای ۵، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ دقیقه بعد از القای بیهودی با کتامین، این اندازه گیریها تکرار شد. برای اندازه گیری فشار خون سرخرگی و جمع آوری نمونه خون، یک کاتتر سرخرگی که با هپارین ۲:۱۰۰۰ میلی لیتر می شود از طریق یک برش ۵ سانتیمتری پوست با استفاده از بیهودی موضعی درون شریان کاروتید قرار داده شد.

تجزیه و تحلیل آماری: برای تحلیل داده ها از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون حداقل اختلاف معنی دار استفاده گردید.

نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده، تعداد ضربان قلب تغییر معنی داری را نشان نداد. متوسط فشار خون سرخرگی در دقایق ۳۰ و ۶۰ بعد از بیهودی کاهش معنی داری داشت. فشار نسبی اکسیژن سرخرگی در دقیقه ۶۰ کاهش معنی داری داشت. فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی ابتدا در دقیقه ۵ افزایش معنی داری داشت و سپس در دقایق ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ ضمن کاهش نسبی همچنان به طور معنی داری بالاتر از حد نرمال باقی ماند اما تعداد تنفس به طور معنی داری تغییر نیافت. دمای بدن در دقایق ۵، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ بعد از بیهودی کاهش معنی داری داشت.

نتیجه گیری: بر طبق این مطالعه ترکیب زایلازین-کتامین تضعیف جزوی بر روی دستگاه قلبی-عروقی دارد. این ترکیب مسئول اختلال مختصر در تهویه، کاهش فشار نسبی اکسیژن، افزایش نسبی دی اکسید کربن سرخرگی و کاهش دمای بدن در طول دوره بیهودی در گوسفند می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

(۱۳۸۳)، دوره ۵۹، شماره ۳، ۲۷۰-۲۶۵.

واژه های کلیدی: گوسفند، زایلازین، کتامین، گازهای خونی، فشار خون.

زایلازین هیدروکلراید یکی از اعضای خانواده آگونیست های گیرنده آلفا دو آدرنرژیک است که با فعال کردن و تحریک گیرنده های آدرنرژیک بر روی دستگاه اعصاب مرکزی اثر می کند. این دارو باعث کاهش اثر سمپاتیکی می شود ولی در اعصاب محیطی باعث افزایش اثر سمپاتیک می شود. زایلازین هیدروکلراید یکی از داروهایی است که به عنوان داروی پیش

(۱) گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران.

(۲) دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز- ایران.

*نویسنده مسئول abaniadam@yahoo.com



یافتن دقیقه ۶۰، آنژیوکت از درون رگ خارج گردید. پس از خونبندی و ضد عفونی موضع عمل، پوست بخیه زده شد. نتایج به دست آمده از اثر ترکیب زایلازین- کتابتین بر روی تعداد ضربان قلب، متوسط فشار خون سرخرگی، تعداد تنفس، فشار نسبی اکسیژن سرخرگی، فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی و دمای بدن ثبت گردیدند. برای مقایسه میانگینهای ۶ فاکتور اندازه گرفته شده مذکور در زمانهای مختلف با زمان صفر از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون حداقل اختلاف معنی دار استفاده گردید.

نتایج

نتایج به دست آمده از اندازه گیری تعداد ضربان قلب بیانگر این مطلب است که، هر چند بین مقادیر هیچ کدام از دقایق ۵، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ با زمان قبل از بیهوشی اختلاف معنی داری وجود ندارد ولی در کل یک کاهش جزئی در تعداد ضربان قلب حاصل شده است. مقدار فشار خون متوسط سرخرگی در این مطالعه بعد از دقیقه ۵ تا دقیقه ۴۵ کاهش و سپس تا دقیقه ۶۰ افزایش یافته ولی به مقدار زمان صفر نرسید و کاهش در مقدار متوسط فشار خون سرخرگی فقط در دقایق ۳۰، ۴۵ و ۶۰ با زمان قبل از بیهوشی اختلاف معنی داری داشت. بعد از تزریق کتابتین تا دقیقه ۵ افت کمی در تعداد تنفس دیده شد که بعد از آن افزایش یافته و در دقیقه ۴۵ به بالاتر از میزان زمان صفر رسید و مجدداً تا حدود مرز طبیعی کاهش یافته. ولی این اختلاف بین مقادیر در دقایق مختلف معنی دار نبود. اندازه گیری فشار نسبی اکسیژن سرخرگی در این مطالعه نشان می دهد که این میزان بعد از تزریق کتابتین تا دقیقه ۵ کاهش یافته و پس از آن تا دقیقه ۴۵ افزایش می یابد ولی در این زمان مقداری کمتر از میزان زمان صفر است. پس از دقیقه ۴۵ تا دقیقه ۶۰ نیز مقداری کاهش می یابد. به طور کلی در تمام دقایق ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ مقدار فشار نسبی اکسیژن سرخرگی کمتر از میزان آن قبل از بیهوشی بود و تنها در دقیقه ۶۰ با زمان قبل از بیهوشی اختلاف معنی داری داشت. بعد از القای بیهوشی میزان فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی تا دقیقه ۵ افزایش و پس از آن تا دقیقه ۶۰ کاهش یافته ولی به حد طبیعی خود بازنگشت به طور کلی در تمام دقایق ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ مقدار فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی بیشتر از میزان آن قبل از بیهوشی بوده است و مقادیر تمامی آنها با مقدار فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی قبل از بیهوشی اختلاف معنی داری داشت. میزان دمای بدن گوسفندان متعاقب بیهوشی با ترکیب زایلازین- کتابتین تا دقیقه ۶۰ بتدريج کاهش یافت و همواره بين مقادير دما در دقایق ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ با زمان قبل از بیهوشی اختلاف معنی داری وجود داشت.

کتابتین اغلب در ترکیب با زایلازین به منظور رسیدن به یک بیهوشی مناسب استفاده می شود ولی باید توجه داشت که این ترکیب، برای ایجاد بیهوشی صدرصد اینم و کامل نخواهد بود و اثرات جانبی و مشکلاتی را نیز به دنبال خواهد داشت. در مطالعه حاضر سعی بر این بوده که تأثیر ترکیب

کاربرد داخل وریدی زایلازین اثرات تسکینی، بی دردی و شلی عضلانی در اسب و گاو ایجاد می شود (۱۹، ۱۹).

کتابتین یک داروی بیهوشی عمومی است که اولین بار در سال ۱۹۶۵ در طب انسانی وارد شد و برای اولین بار در دامپزشکی در سال ۱۹۷۰ در بیهوشی گرمه مطرح گردید. این دارو فاقد اثرات مهاری قلبی- عروقی می باشد. به راحتی از طریق داخل عضلانی و وریدی مصرف می گردد و به دلیل pH پائین هنگام تزریق داخل عضلانی مقداری صدمه بافتی دیده می شود. کتابتین متداولترین داروی جدا کننده مورد استفاده در حیوانات می باشد (۱۰).

مواد و روش کار

تعداد ۵ راس گوسفند دنبه دار سالم ایرانی یک ساله با میانگین وزن ۲۱/۴ کیلوگرم انتخاب شدند. ۲۴ ساعت قبل از هر عمل به گوسفند پرهیز غذایی داده شد و تنها آب در اختیار آن قرار گرفت. قبل از بیهوشی دمای مقدعدی، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در دقیقه اندازه گیری شد. هم‌زمان دستگاه فشار سنج جهت اندازه گیری فشار خون آماده گردید. تمامی لوله محتوی هپارین ۲ در هزار بود به طوری که ستونی از هوا به اندازه ۸- ۸ سانتی‌متر زیر فشار سنج قرار داشت (۱۰).

دام به نحوی روی میز جراحی گذاشته شد که سمت چپ آن بر روی میز باشد پس از ایجاد بیحسی با لیدوکائین ۱ درصد برای دستیابی به شریان کاروتید مشترک و ورید و داج، در قسمت میانی ناوдан و داجی برشی طولی به طول ۵ سانتی‌متر بر روی پوست ایجاد شد و عضله جناغی رأسی با عمل کندکاری کنار زده شد و تنه واگو سمپاتیک از کنار شریان کاروتید به روش کندکاری جدا گردید. سپس آنژیوکت شماره ۱۸ به صورت مورب به درون شریان وارد شده و به دستگاه فشار سنج که از قبل آماده شده بود وصل گردید. تا پایان عمل به منظور جلوگیری از ایجاد لخته در آنژیوکت با استفاده از سرنگ ۲۰ سی سی به طور متناوب هر چند دقیقه یک بار حدود ۳-۵ سی سی از محلول نرمال سالین به آنژیوکت تزریق شد. برای گرفتن نمونه‌های خون سرخرگی از سرنگ‌های استریل ۲ سی سی استفاده شد. قبل از خونگیری سطح داخل این سرنگ ها با هپارین ۲ واحد در میلی لیتر آغشته شد. در هر بار با احتیاط لازم جهت هواگیری کامل حدود ۱-۲ سی سی خون گرفته شده و با دستگاه آنالیز گازهای خونی پارامترهای مختلف اندازه گیری گردید. قبل از تزریق داروی پیش بیهوشی متوسط فشار خون سرخرگی از روی فشار سنج عقربه‌ای خوانده و یادداشت شد (زمان قبل از تزریق زایلازین به عنوان زمان صفر در نظر گرفته شد). پس از انجام اعمال فوق، زایلازین هیدروکلراید ۲ درصد به میزان ۰/۲ میلی گرم بر کیلوگرم به صورت عضلانی تزریق و پس از ۱۵ دقیقه تا ایجاد اثر آرایبکسی زایلازین، کتابتین هیدروکلراید ۱۰ درصد به آرامی به میزان ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم در ورید و داج تزریق شد. به ترتیب در زمانهای ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ دقیقه بعد از تزریق کتابتین، گرفتن نمونه خون به روش مذکور و ثبت متوسط فشار خون، تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب و گرفتن دمای مقدعدی انجام پذیرفت. پس از پایان



جدول ۱- میانگین و انحراف معیار پارامترهای مختلف در ۵ رأس گوسفند تحت بیهودی با زایلازین-کتابمین.

زمان (دقیقه)	۰(a)	۵(b)	۱۵(c)	۳۰(d)	۴۵(e)	۶۰(f)
میانگین و انحراف معیار ضربان قلب (تعداد / دقیقه)	-	-	-	-	$83/20 \pm 19/62$	$73/20 \pm 14/46$
میانگین و انحراف معیار فشار متوسط سرخرگی (میلیمتر جیوه)	$10.9/60 \pm 1.0/80$	$11.0/40 \pm 1.1/88$	$10.0/40 \pm 1.2/75$	$88/60 \pm 1.4/31$	$87/40 \pm 1.3/55$	$91/40 \pm 1.1/39$
میانگین و انحراف معیار تعداد تنفس (تعداد / دقیقه)	$45/0.0 \pm 2.9/77$	$31/40 \pm 5/36$	$44/0.0 \pm 2.9/47$	$42/80 \pm 3.4/33$	$47/20 \pm 2.4/0.2$	$42/40 \pm 1.7/16$
میانگین و انحراف معیار فشار نسبی اکسیژن سرخرگی (میلیمتر جیوه)	$123/48 \pm 3.0/27$	$100/50 \pm 4.5/65$	$116/62 \pm 3.8/74$	$119/88 \pm 3.9/95$	$120/22 \pm 3.4/79$	$115/56 \pm 3.1/52$
میانگین و انحراف معیار فشار نسبی اکسید کربن دی سرخرگی (میلیمتر جیوه)	$41/54 \pm 1.1/84$	$60/34 \pm 1.1/75$	$53/0.6 \pm 2/17$	$47/28 \pm 2/13$	$46/26 \pm 2/55$	$45/34 \pm 3/23$
میانگین و انحراف معیار دمای بدن (درجه سانتیگراد)	$39/46 \pm 0.120$	$39/38 \pm 0.13$	$39/0.8 \pm 0.16$	$38/92 \pm 0.10$	$38/74 \pm 0.08$	$38/66 \pm 0.18$

* در هر مورد معنی دار بودن تغییرات نسبت به زمانهای دیگر با قید حرف یا حروف در کنار هر یک از پارامترها آورده شده است (P<0.05).

گرگ، گوساله، گربه، موش رت و خوکچه هندی انجام شده است نیز کاهش متوسط فشار خون را متعاقب مصرف ترکیب زایلازین - کتابمین نشان می دهد. اثر زایلازین بر روی فشار خون سرخرگی از طریق تحریک رسپیتورهای پیش سیناپسی آدرنرژیک اعمال می شود. بنابراین این طور به نظر می رسد که اثرات سمپاتومیمتیکی مرکزی کتابمین، تحت الشاعع فعالیت ضدسمپاتیکی زایلازین قرار می گیرد. کتابمین هنگام القای بیهودی اثر اتساع عروقی دارد که با یک اثر انقباض عروقی طولانی ایجاد شده با تضعیف مرکزی مستقیم فعالیت بازو رسپیتورها دنبال می گردد. بازو رسپیتورها سپس به صورت واکنشی عملکرد سمپاتیکی را به مهار مستقیم پذیرش نوراپی نورین در انتهای های اعصاب آدرنرژیک افزایش می دهند که منجر به فعالیت سمپاتومیمتیکی محیطی می شود. هنگام مصرف تأمین زایلازین و کتابمین، اثرات انقباض عروقی کتابمین مهار می شود. با این وجود مطالعه ای که اثر ترکیب زایلازین-کتابمین را طی یک دوره بیهودی وریدی ۱۲ ساعته در موش رت بررسی کرده است نشان داد که در این مدت متوسط فشار خون سرخرگی بالاتر از میزان طبیعی آن در این حیوان بوده است (۴۵.۶.۷.۸.۱۲.۱۶.۲۱.۲۲).

اگر چه میانگین تعداد تنفس در ابتدا کاهش یافته و روند متغیری را طی می کند ولی این اختلافات به دلیل انحراف معیار بالا معنی دار نبوده است. در مطالعه ای که اثر زایلازین-کتابمین را بر روی ۶ قلاده سگ بررسی کرده است، تعداد تنفس متعاقب تزریق کتابمین تا دقیقه ۳۰ کاهش و سپس تا دقیقه ۹۰ افزایش یافته و به بالاتر از محدوده طبیعی رسیده و پس از آن به اندازه طبیعی بازگشته است. در مطالعه انجام شده در گربه بعد از القای بیهودی با استفاده از ترکیب زایلازین - کتابمین ابتدا کاهشی در تعداد تنفس در دقیقه ۱۰ ایجاد شد که تا دقیقه ۱۲۰ رو به افزایش نهاد. در مطالعه ای که بر روی خرگوش انجام پذیرفت، بیهودش کردن این حیوان با ترکیب


زایلازین - کتابمین بر روی تعداد ضربان قلب، متوسط فشار خون سرخرگی، تعداد تنفس، فشار نسبی اکسیژن سرخرگی، فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی و دمای بدن به مدت ۶۰ دقیقه بعد از بیهودی در ۵ رأس گوسفند ارزیابی شود و اثرات این ترکیب بر روی فیزیولوژی و هموستانز بدن بویژه در دستگاههای تنفسی و قلبی-عروقی بررسی گردد.

این مطالعه کاهش تدریجی ضربان قلب را نشان می دهد. مطالعاتی که در گذشته بر روی سگ، اسب، گرگ، موش رت، خرگوش، گربه و گوساله انجام شده است نیز کاهش تعداد ضربان قلب را متعاقب مصرف ترکیب زایلازین کتابمین نشان می دهد (۵.۶.۹.۱۱.۱۲.۱۳.۱۷.۲۰.۲۱.۲۲).


رفلکس تحریکی بازو رسپیتورهای کلروتید ایجاد شده توسط کاهش فشار خون و کاهش فعالیت سمپاتیکی و افزایش فعالیت واگی ناشی از زایلازین ممکن است در کاهش تعداد ضربان قلب در ترکیب زایلازین - کتابمین دخیل باشد. زایلازین بر روی فعالیت سمپاتیکی و اثر مهار کنندگی فیدبک بازو رسپیتورها و کاهش فعالیت عصب واگ ناشی از کتابمین غبله می کند و منجر به کاهش تعداد ضربان قلب می شود. در نتیجه دستگاه قلبی-عروقی تحت غلبه اثر زایلازین قرار می گیرد که منجر به کاهش ضربان قلب می گردد با این وجود در مطالعه ای که موش رت به مدت ۱۲ ساعت تحت بیهودی با ترکیب زایلازین-کتابمین بود ضربان قلب افزایش مختصری نشان داد. مطالعه دیگری که اثر بیهودی ترکیب زایلازین-کتابمین را در گربه بررسی کرده است، نشان داده است که در مدت ۱۲۰ دقیقه، این رژیم بیهودی سبب افزایش در تعداد ضربان قلب گشته است (۱۲.۱۶.۲۰.۲۱).

رونده تغییرات فشار خون متوسط سرخرگی در این مطالعه در ابتدا کاهشی بوده که در نهایت روند صعودی داشته ولی به میزان زمان صفر نرسیده است. مطالعاتی که در گذشته بر روی گوسفند، سگ، خرگوش،







نمودار ۲ - میانگین فشار نسبی اکسیژن و فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی (میلیمتر جیوه) در ۵ رأس گوسفند پس از بیهوشی با زایلازین - کتامین.



نمودار ۱ - تغییرات میانگین تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس (تعداد در دقیقه) در ۵ رأس گوسفند پس از بیهوشی با زایلازین - کتامین.



نمودار ۴ - میانگین دمای بدن (درجه سانتیگراد) در ۵ رأس گوسفند پس از بیهوشی با زایلازین - کتامین.



نمودار ۳ - میانگین فشار خون متوسط سرخرگی (میلیمتر جیوه) در ۵ رأس گوسفند پس از بیهوشی با زایلازین - کتامین.

به مدت ۶۰ دقیقه بررسی کردہ‌اند کاهش فشار نسبی اکسیژن سرخرگی دیده شده است. اثر شل‌کنندگی مستقیم و غیرمستقیم کتامین بر روی عضلات صاف برونش‌ها، ممکن است سبب کاهش تهویه و کاهش اکسیژن سرخرگی گردد که منجر به پائین آمدن فشار نسبی اکسیژن سرخرگی می‌گردد. کاهش اولیه و سپس افزایش در فشار نسبی اکسیژن سرخرگی متعاقب آن در ارتباط با اثر تضعیف کنندگی کوتاه مدت کتامین است. به علاوه مشاهده شده است که کتامین با افزایش مقاومت عروق ریوی و در نتیجه کاهش جریان خون ریوی در انسان سبب کاهش اکسیژن خون سرخرگی شده است. تزریق زایلازین به تنها یی در گوسفندهای هوشیار فشار اکسیژن سرخرگی را پائین آورده است. محققین این مشاهدات را به گیرنده‌های آلفا دو آدرنرژیک محیطی و عدم تعادل مربوط به انتشار، بین تهویه و گردش خون ریوی نسبت می‌دهند. با توجه به اینکه در این مطالعه کاهش فشار اکسیژن سرخرگی بعد از زمان صفر تا دقیقه ۵ و همچنین بعد از دقیقه ۴۵-۵۰ به موازات کاهش در تعداد تنفس در زمانهای مربوطه می‌باشد، به نظر می‌رسد که این ترکیب دارویی بر روی عمق تنفس تأثیر چندانی ندارد و میزان اکسیژن سرخرگی در تعداد تنفس دستخوش تغییرات گردیده است (۲۲، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۱، ۲۲).

در این مطالعه میانگین فشار نسبی دی اکسید کربن سرخرگی در ابتدا افزایش و سپس روند کاهشی داشته است. در مطالعاتی که اثر زایلازین کتامین را بر روی موش رت، خرگوش و خوکچه هندی بررسی کرده است، این افزایش فشار نسبی دی اکسید کربن را تصدیق می‌کند. افزایش فشار

زایلازین - کتامین منجر به کاهش معنی‌داری در تعداد تنفس در دقیقه ۱۵ گردید که پس از آن افزایش یافت ولی این افزایش قابل مقایسه با تعداد تنفس کاهش یافته نبود و تعداد تنفس همچنان خیلی کمتر از حد طبیعی بود. مطالعه‌ای بر روی بز، کاهش قابل توجهی در تعداد تنفس متعاقب مصرف عضله‌ای زایلازین نشان می‌دهد و همچنین در مطالعه دیگری که بر روی سگ انجام شده بیان می‌کند که مصرف کتامین تعداد تنفس را کاهش می‌دهد و بعد از ۱۵ دقیقه به مقدار طبیعی خود باز می‌گردد. مکانیسم کاهش تعداد تنفس در خلال بیهوشی شاید مربوط به کاهش پاسخ کمورسپتورهای محیطی و مراکز تنفسی مرکزی نسبت به دی اکسید کربن باشد. در مطالعه‌ای که اثر زایلازین - کتامین را بر روی گوساله‌های نوزاد بررسی کرده است این چنین عنوان می‌کند که بعد از هر تزریق تعداد تنفس افزایش می‌باشد (۲۰، ۳.۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۸).

نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری فشار نسبی اکسیژن سرخرگی روند کاهش و سپس روند افزایشی را نشان می‌دهد. در یک مطالعه بر روی سگ متعاقب مصرف زایلازین - کتامین، فشار نسبی اکسیژن سرخرگی تا دقیقه ۱۵ کاهش و بعد از آن افزایش یافت. مطالعه دیگری که اثر زایلازین - کتامین را بر روی موش رت آزمایش کرده است نشان می‌دهد که فشار نسبی اکسیژن سرخرگی ۱۵ دقیقه بعد از القای بیهوشی کاهش یافته و بعد از آن افزایش یافته است. در مطالعاتی که اثر بیهوشی زایلازین - کتامین را بر روی اسپ به مدت ۲۰ دقیقه، موش رت به مدت ۱۲ ساعت (متعاقب تزریق مداوم وریدی)، خرگوش به مدت ۴ ساعت (در پی تزریق مداوم وریدی) و خرگوش



References

۱. صدیقی، م.ر. (۱۳۷۸): مبانی بیهودشی در حیوانات کوچک، انتشارات فردوسی مشهد، صفحه: ۲۷، ۴۳.
۲. وصال، ن. (۱۳۷۷): اصول بیهودشی دامپزشکی انتشارات دانشگاه شیراز، صفحه: ۳-۸.
3. Adams, H.R. (2001): Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 8th ed. Iowa State University press, Ames, PP: 247-267, 314-342,377,382.
4. Allen, D.G., Dyson, D.H., Pascoe, P.J. and O'Grady, M.R. (1986): Evaluation of a xylazine-ketamine hydrochloride combination in cat. Canadian J. Vet. Res. 50: 23-6.
5. Blaze, C.A., Helland, R.E. and Grant, A.L. (1998): Gas exchange during xylazine-ketamine anesthesia in neonatal calves. Vet. Surg. 17: 155-9.
6. Borkowski, G.L. Danneman, P.J., Russell, G.B. and Lang, C.M. (1990): An evaluation of three intravenous anesthetic regimes in New Zealand rabbits. Lab. Ani. Sci. 40: 270-276.
7. Brown, J.N., Thorne, D.R. and Nattil, A.L. (1989): Blood pressure and other physiological responses in awake and anesthetized guinea pigs. Lab. Ani. Sci. 39: 142-8.
8. Coulson, N.M. (1989): The cardiorespiratory effects of diazepam-ketamine and xylazine-ketamine anesthetic combinations in sheep. Lab. Anim. Sci. 39: 591-597.
9. Dutt, B.K., Hossain, M. A. and Rahman, M.M. (1998): Evaluation of some injectable sedatives and anaesthetics in the rabbit, Bangladesh Veterinarian. 15:1-2, 13-17.
10. Hall, L.W., Clarke, K.W. and Trim, C.M. (2001): Veterinary Anesthesia, 10th ed. W.B. Saunders CO. London, PP: 10-28, 29-60, 113-129.
11. Hobbs, B.A., Rolhall, T.G., Sprenkel, T.L. and Anthony, K.L. (1991): Comparison of several combination for anesthesia in rabbits. Am. J. Vet. Res. 52: 669-674.
12. Kul, M., Koc, Y., Alkan, F. and Orgurtan, Z. (2000): The effects of xylazine-ketamine and diazepam - ketamine on arterial blood pressure and blood gases in dogs. Online J. Vet. Res. 4:124-132.
13. Mothews, N.S., Dollars, N.S., Young, D.B. and Shawley, R.V. (1991): Prolongation of xylazine-ketamine induced recumbency time with temazepam in horses. Equine Vet. J. 23: 8-10.
14. Muir, W.W. and Hubbell, J.A.E. (1994): Handbook of Veterinary Anesthesia. 2nd ed. Mosby, St. Louis, PP: 1-7, 227-261.

نسی دی اکسیدکربن سرخرگی احتمالاً ممکن است به دلیل کاهش تهویه ریوی ناشی از اثر شل کنندگی کتابخانه بر روی عضلات صاف برونش ها باشد و یا اینکه در اثر کاهش جریان خون ریوی ایجاد شده توسط کتابخانه حاصل شود. حالت خوابیدن دام به سمت چپ به دلیل فشار بر روی ریه سمت چپ ممکن است منجر به تغییر در انتشار ریوی و عمق تنفس و در نهایت افزایش فشار دی اکسیدکربن و کاهش فشار اکسیژن خون گردد. با این وجود این حالت در اغلب جراحیها یک حالت عمومی می باشد. مطالعه ای که اثر زایلازین - کتابخانه را بر روی سگ بررسی کرده است نشان می دهد که بعد از القای بیهودشی با وجود کاهش تنفس در این زمان، فشار نسبی دی اکسیدکربن سرخرگی کاهش یافته و سپس بالا رفته و در حد طبیعی قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اینکه تعداد تنفس بعد از القای بیهودشی تا دقیقه ۵ کاهش یافته و سپس افزایش داشته است لذا در افزایش اولیه و کاهش ثانویه میزان فشار نسبی دی اکسیدکربن خون سرخرگی بی تأثیر نبوده است (۶,۷,۱۶,۲۱,۲۲).

میانگین درجه حرارت پس از استفاده از داروهای زایلازین - کتابخانه روند کاهشی مشخصی را طی می کند. مطالعات انجام شده بر روی سگ و خرگوش نشان داده است که مصرف زایلازین - کتابخانه در این حیوانات با کاهش مختصر دما همراه خواهد بود. در حالی که در مطالعه دیگری که بر روی خرگوش انجام گرفته است مصرف این ترکیب دارویی منجر به کاهش دمادر این حیوان نشده است (۱۱,۱۲,۲۲).

این مطالعه بیانگر این مطلب است که ترکیب زایلازین - کتابخانه سبب تضعیف جزئی دستگاه قلبی-عروقی گوسفند می گردد و همچنین سبب اختلال مختصر دستگاه تنفس در تهویه مناسب، فراهم کردن اکسیژن و دفع دی اکسیدکربن خون می شود. همان طور که در این مطالعه مشاهده گردید ترکیب زایلازین - کتابخانه در گوسفند سبب افت دمای بدن در خلال بیهودشی می گردد. بنابراین هنگام استفاده از ترکیب زایلازین - کتابخانه گوسفندهای مبتلا به بیماریهای قلبی - عروقی و بیماریهای تنفسی باید احتیاط لازم صورت گیرد و در حین بیهودشی مراقبتهای لازم و جدی ضروری است و همچنین بیهودش کردن گوسفند در هوای سرد با این ترکیب نیازمند تمهیدات لازم است و می بایست در طول مدت بیهودشی از انجام کلیه اعمالی که سبب افت دمای بدن می گردد اجتناب شود.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران که در قالب طرح پژوهشی پایان نامه‌ای هزینه انجام این مطالعه را فراهم نمودند تشکر و قدردانی می گردد.



15. Paddleford, R.R.(1999): Manual of Small Animal Anesthesia. 2nd ed. W.B.Saunders CO. Philadelphia, PP: 31-79, 169-226.
16. Simpson, D.P. (1997): Prolonged (12 hours) intravenous anesthesia in the rat. *Lab. Anim. Sci.* 47: 519-23.
17. Sladky, K., Kelly, B.T., Loomis, M.R., Stoskopf, M.K. and Horne, W.A. (2000): Cardiorespiratory effects of four α_2 adrenoreceptor agonist-ketamine combinations in captive red wolves. *JAVMA. Assoc.* 217: 1366-71.
18. Thurmon, J.C., Tranquilli, W.J. and Benson, G.J. (1999): Essentials of Small Animal Anesthesia and Analgesia. 1st ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. PP: 16-125, 192-224.
19. Thurmon, J.C., Tranquilli, W.J. and Benson G.J. (1996): Lumb and Jones Veterinary Anesthesia, 3rd ed., Williams and Wilkins. Baltimore. PP: 2-3, 183-240, 409-424.
20. Verstegen, J., Fargetton, X., Donnay, I. and Ectors, F. (1991): An evaluation of medtomidine-ketamine and other drug combinations for anaesthesia in cats. *Vet. Rec.* 128: 32-35.
21. Wixson, S.K., White, W.J., Hughes, H.C., Lang, C.M. and Marshall, W.K. (1987): The effects of pentobarbital, fentanyl– droperidol, ketamine–xylazine and ketamine – diazepam on arterial blood pH, blood gases, mean arterial blood pressure and heart rate in adult male rats. *Lab. Anim. Sci.* 37: 736-42.
22. Wyatt, J.D., Scott, R.A.W. and Richardson, M.E. (1989): The effects of prolonged ketamine–xylazine intravenous infusion on arterial blood pH, blood gases, mean arterial blood pressure, heart and respiratory rates, rectal temperature and reflexes in the rabbit. *Lab. Anim. Sci.* 939: 411-415.

