

اولین گزارش درباره وجود و ریخت شناسی پروبستمیریا ویوپارا (*Probstmayria vivipara*)

علی اسلامی^{۱*} بهنام مشگی^۱ ثریا نائمه^۲

^۱ گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران

^۲ گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران

(دریافت مقاله: ۱۳۸۴ اردیبهشت ماه؛ پذیرش نهایی: ۱۷ خرداد ماه ۱۳۸۵)

چکیده

در بررسی محتويات لوله‌گوارش ۱۰ راس الاغ از قلوون ۶ راس پروبستمیریا ویوپارا جدا گردید. بر اساس آزمایش ۲۰ کرم نر و ۲۰ کرم ماده مشخصات ریخت شناسی آنها تعیین گردید. اکثر ابعاد متريک تعیین شده در اين بررسی در مقاييسه با ارقام گزارش شده برای تعداد محدودی از انداها (شامل: طول کرم نر و ماده، طول مری و طول اسپيکول) توسيع نوو-لمر (۱۹۳۶) بزرگتر بودند.

واژه‌های کليدي: پروبستمیریا ویوپارا، زیست شناسی، الاغ.

علب احاطه شده است. مری از سه قسمت قدامی ماهیچه‌ای و میانی و خلفی که در انتهای حباب و در یقه ختم می‌شود تشکيل شده است سایر مشخصات آن در جدول انشان داده شده است. ضمناً انتهای خلفی کرم نر پیچ خورده بود، گوبيناکولوم وجود نداشت و مجرای ازان اسپرم شدیداً ماهیچه‌ای شده بود. دم کرم ماده مستقیم و به نوک ساده‌ای ختم می‌شد. اکثر مشخصات ارائه شده در جدول ۱ برای اولين بار تعیین گردیده‌اند و اختلافاتي رابا مشخصات داده شده توسيط Lemaire در سال ۱۹۳۶ درسن Neveu نشان می‌دهند.

بحث

بررسی کتاب‌ها، مقالات و جستجوی اينترنتي نشان داد که مشخصات ریخت شناسی پروبستمیریا ویوپارا اولين بار توسيط Neveu-Lemaire در سال ۱۹۳۶ شرح داده شده است و فقط طول نر و ماده، طول اسپيکول و

مقدمه

پروبستمیریا ویوپارا جزء فوق خانواده کوسموسرسوئیدا (Cosmocercoidea) و خانواده اتراكتیده (Atractidae) می‌باشد Anderson (اندرسون، ۱۹۹۲) سير تکاملی آن در بين کرم‌های راسته اسکاريدیدا یگانه است زیرا فاقد مرحله آزاد زی می‌باشد. کرم‌های موجود در قلوون نوزادها در قلوون بالغ شده و موجب آلودگی خود به خود حیوان می‌شوند. نحوه آلوده شدن سایر حیوانات با این انگل به خوبی مشخص نیست و ممکن است مراحل مختلف رشد انگل با مدفوع خارج شده و باعث آلوده شدن سایر حیوانات گردد. كامل ترين گزارش درباره ریخت شناسی انگل هفتاد سال پيش توسيع Neveu-Lemaire در سال ۱۹۳۶ ارائه شده و پس از آن نويسندگان مختلف در كشورهای مختلف برای شرح انگل همان مشخصات را تكرار کرده‌اند.


هدف از بررسی حاضر تعیین وجود پروبستمیریا ویوپارا در نک سمي‌های ايران و مطالعه ریخت شناسی آن می‌باشد.

مواد و روش کار

کرم‌های موجود در قلوون الاغ‌های ذبح شده در باغ و حش برای تغذيه گوشتخواران و حشی، پس از شستشوی محتويات در الک ۱۰۰ جدا شدند کرم‌های جدا شده در الک ۷۰ درصد حاوی ۵۵ درصد گليسرين حفظ و سپس ابعاد موردنظر، در ۲۰ کرم نر و ماده شفاف شده در گليسرين با استفاده از لام ميكرومتری چشمی اندازه‌گيري می‌شد (۱).

نتایج

در بررسی حاضر پروبستمیریا ویوپارا برای اولين بار از لوله گوارش ۶ رأس الاغ مطالعه شده جدا گردید (۶۰ درصد) و از يك رأس آنها بيش از ۵۰۰ هزار عدد کرم جمع آوري شد. اين نماتود کرم کوچکی است که دهانش توسيط تصویر ۱- انتهای قدامی و خلفی پروبستمیریا ویوپارا.
۱- لب، ۲- دهان، ۳- بخش ماهیچه‌ای مری، ۴- حلقه عصبی، ۵- منفذ دفعی، ۶- در یقه مری، ۷- اسپيکول.



تصویر ۱- انتهای قدامی و خلفی پروبستمیریا ویوپارا.
۱- لب، ۲- دهان، ۳- بخش ماهیچه‌ای مری، ۴- حلقه عصبی، ۵- منفذ دفعی، ۶- در یقه مری، ۷- اسپيکول.



جدول ۱- مشخصات پروستتیمیریا و یوپیارا بر اساس اندازه‌گیری ۲۰ کرم نرموماده جدایشده از الاغ.

| عضو | حداکثر (میلی‌متر) | حداقل (میلی‌متر) | میانگین و انحراف معیار (میلی‌متر) | نحو-لمر (میلی‌متر) | ازویی (میلی‌متر) (۱۹۶۳) |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| طول نر | ۲/۱۰ | ۳/۱۰ | ۲/۶۵±۰/۲۷ | ۲ | ۲-۳ |
| طول ماده | ۲/۲۰ | ۴ | ۳/۲۳±۰/۴۹ | ۲/۹ | ۲-۳ |
| طول دهان | ۰/۰۴۶ | ۰/۰۸ | ۰/۰۶۴±۰/۰۱۲ | * | * |
| طول مری | ۰/۰۸۷ | ۰/۰۴۵۶ | ۰/۳۴۳±۰/۰۴۷ | /۴-۰/۵ | * |
| طول اسپیکول راست | ۰/۰۶۱ | ۰/۰۸۴ | ۰/۰۷۶±۰/۰۰۷ | /۰۵۸ | /۰۵۸ |
| طول اسپیکول چپ | ۰/۰۶۷ | ۰/۰۸۸ | ۰/۰۸±۰/۰۰۶ | /۰۶۷ | /۰۶۷ |
| فاصله منفذ دفعی تا انتهای قدامی | ۰/۰۲۷۶ | ۰/۰۴۵۰ | ۰/۰۷۹±۰/۰۴۲ | * | * |
| فاصله مخرج تا انتهای خلفی | ۰/۹ | ۱/۳۵۰ | ۱/۱۱±۰/۱۳ | * | * |

* هیچگونه گزارشی در باره این موارد وجود ندارد.

References

۱. اسلامی، علی(۱۳۷۶) کرم شناسی دامپزشکی جلد سوم، نماتودها و آکانتوسفالها، چاپ دوم، انتشاراتدانشگاه تهران.
2. Anderson, R.C. (1992) Nematode parasites of Veterinaries, Their Development and Transmission. CAB International, 228-229.
3. Euzeby, J. (1963) Les maladies Vermineuses des Animaux Domestiques Et Leur Incidence Sur la Pathologie Humaine. Vigot Freres, Editeurs, 39.
4. Levine, N.D. (1968) Nematode Parasites of Domestic Animals and Man. Burgess Publishing Company. Minneapolis, 388-389.
5. Neveu-Lemaire, M. (1936) Traite D'Helminthologie Medical et Veterinaire. Vigot Freres, Editeurs. 732.
6. Soulsby, E.J.L.(1982) Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticat Animals. Bailliere Tindall and Cassell. 172.

مری را تعیین کرده و سایر نویسنده‌گان (Levine, ۱۹۶۳ در درسال ۱۹۶۸ در سال ۱۹۶۸ Soulsby, ۱۹۸۲ در سال ۱۹۹۲ Anderson در سال ۱۹۹۲) برای شرح ریخت شناسی انگل همین اطلاعات را نقل کرده‌اند. اگرچه در سال ۱۹۶۳ Euzeby در سال ۱۹۶۳ به وجود ۶ لب و مجرای انزالت اسپرم شدیداً ماهیچه‌ای انگل اشاره کرده است اکثر مشخصات تعیین شده در این بررسی بجز مری بزرگتر از اقسام گزارش شده توسط Neveu-Lemaire ۱۹۳۶ در گزارش Neveu-Lemaire بود. در گزارش Neveu-Lemaire طول کرم نرموماده و مری به ترتیب ۲/۹ و ۰/۵ میلی‌متر است که کوچکتر ولی تا حدودی نزدیک به یافته‌های این بررسی می‌باشد. طول اسپیکول که معیار مهمی برای تشخیص گونه می‌باشد در بررسی حاضر میانگین آن برای اسپیکول راست ۰/۷۶ میکرون و برای اسپیکول چپ ۰/۴۰ میکرون تعیین گردید، در حالی که در سال ۱۹۳۶ Neveu-Lemaire طول اسپیکول راست را ۰/۵۸ و طول اسپیکول چپ را ۰/۶۷ میکرون ذکر کرده است که نشان دهنده اختلاف زیادی بین اعداد بدست آمده در دو بررسی می‌باشد. چون جدیداً مشخصات این انگل شرح داده نشده است نمی‌توان این تغییرات را نشانه تبعیق بین گونه‌های دانست. برای اظهار نظر دقیق در این مورد با ید نمونه‌هایی از سایر کشورها نیز آزمایش شود ولی تا انجام بررسی‌های تکمیلی باید طول اسپیکول چپ نمونه‌های آزمایش شده در ایران را بین ۰/۶۷-۰/۸۸ میکرون و اسپیکول راست را بین ۰/۶۱-۰/۸۴ میکرون در نظر گرفت.



FIRST REPORT ON THE PRESENCE OF PROBSTMAYRIA VIVIPARA AND ITS REDESCRIPTION

Eslami, A.^{1*}, Meshgi, B.¹, Naem, S.²

¹Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran

²Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Uremia University, Uremia-Iran

(Received 22 April 2005 , Accepted 7 June 2006)

Abstract:

Probstmayria vivipara was collected from the contents of colons of 6 out 10 donkeys. The redescription of morphology was carried out by the examination of 20 males and 20 females. The dimension of most of the determined characteristics was larger than that previously described by Neveu-Lemaire (1936), such as the total length of male and female, as well as the length of esophagous and spicules.

Key words: *Probstmayria vivipara*,redescription.

*Corresponding author's email: aislami@ut.ac.ir, Tel: 021-66923095, Fax: 021-66933222

